



Trabalhos Científicos

Título: Doença De Kawasaki Fora Da Faixa Etária Habitual - Relatos De Caso

Autores: MOACIR BATISTA DE CAMPOS NETO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO), RODRIGO VASCONCELOS MARZOLA (HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO), MARIANA GASPAR MENDONÇA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** A doença de Kawasaki é uma vasculite aguda de etiologia desconhecida. Por acometer vasos de médio calibre, pode levar a manifestações multissistêmicas, sendo o coração o órgão com maiores repercussões a longo prazo. O relato a seguir descreve dois casos da doença em pacientes fora da faixa etária habitual, tornando o diagnóstico mais desafiador. **DESCRIÇÃO:** Escolar de 7 anos há 7 dias com febre, dor abdominal, náuseas, mal estar geral, que evoluiu para icterícia colestática, colúria, hipocolia fecal e alteração de transaminases além de rash cutâneo pruriginoso. Internada para investigação, pensando tratar-se de hepatite medicamentosa com manifestação alérgica, por estar em uso de paracetamol e amoxicilina, após diagnóstico equivocado de amigdalite bacteriana. Lactente 5 meses, há 11 dias com febre, não cessada após 5 dias de ceftriaxone, além de adenomegalia cervical, e inflamação de cicatriz vacinal BCG. Internada para investigação etiológica. Ambas as pacientes evoluíram durante internação com edema de mãos e pés, descamação periungueal, conjuntivite bilateral não purulenta e língua em framboesa, além de alterações laboratoriais típicas – anemia, trombocitose, hipoalbuminemia e aumento de proteínas inflamatórias, com melhora após imunoglobulina. A lactente mantém em uso de AAS e acompanhamento com a cardiologia por aneurisma de coronária detectado em ecocardiograma. **DISCUSSÃO:** Apesar de estarem fora dos extremos de idade descritos, as pacientes não podem se classificar como Kawasaki incompleto/atípico, por terem preenchido os critérios clínicos diagnósticos. Hepatite e inflamação de cicatriz vacinal não compõem os critérios, mas podem ser observados. **CONCLUSÃO:** Em virtude da sintomatologia variada, pode simular várias outras condições, principalmente infecciosas. É essencial que o profissional esteja familiarizado com seus critérios diagnósticos para a suspeição e tratamento, mesmo em casos fora da faixa etária comumente acometida, a fim de evitar as consequências a longo prazo da maior causa de cardiopatia adquirida em países desenvolvidos – a doença de Kawasaki.