



Trabalhos Científicos

Título: Lúpus Eritematoso Sistêmico E Chikungunya Em Pré Adolescente – Relato De Caso

Autores: LOHAYNNE LOPES DE FREITAS VOIGT (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), ALINE MARTINS PEREIRA (FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL - RO FACIMED), JULIANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), FABIANA CASTRO ARONI BAZAN (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), DANIELLE MORESCO SANVIDO (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), JOELSON CAMILO LOPES (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), KARIN CHRISTINA SONDA DE SOUZA (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), ADONIS MENDES JUNIOR (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), EDIVÂNIA FERNANDES DE MELO TRINDADE (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), JESSICA KAROLINY COSTA SANTOS (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), DAHYANNE MARQUES PERSCH (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), JANAINA HUCZOK (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), TATIANA KERCKHOFF DOS SANTOS (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), FLAVIO PIERETTE FERRARI (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO), FLAVIO EDUARDO SILVA (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - RO)

Resumo: Introdução: o lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença de etiologia desconhecida. Este relato de caso descreve um caso simultâneo de LES e Chikungunya. Descrição do caso: Paciente de 11 anos, sexo feminino, com queixa de febre, hiporexia, perda ponderal, adinamia, artralgia e palidez cutânea associado a epistaxe e úlceras orais durante 15 dias. Ao exame físico: prostrada, hipocorada com linfonodomegalia na região cervical, rash malar e úlceras na mucosa oral. Exames laboratoriais: pancitopenia , proteinúria subnefrótica , fator anti núcleo com titulação 1/640, Anti-Smith positivo, hipocomplementenemia e sorologia para chikungunya IgG e IgM reagente, fechando ambos diagnósticos. Discussão: Diversos estudos sugerem um componente multifatorial do LES que acarretam em anormalidades no sistema imune as quais tipificam a patogênese da doença. Pode-se ressaltar que as infecções virais, como chikungunya pode modificar a atividade do LES, e também as duas cursam com sintomas e liberação de mediadores inflamatórios semelhantes, gerando dificuldade no acompanhamento clínico dos pacientes. Conclusão: A coexistência do LES e chikungunya pode aumentar a gravidade do quadro. Além de dificultar o diagnóstico diferencial em regiões endêmicas para chikungunya. Referências: GUIMARÃES, M.F.B.R., MONTEIRO, D.P., MURATORI, C.A., JENSEN, T.A. Diagnostico simultâneo de lúpus eritematoso sistêmico e chikungunya. Rev. Med Minas Gerais. UNIBH. Belo Horizonte. 2018. N 28. Disponível em: <http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/2372>. Acessado em : 26/07/2019. DA COSTA, L.M., COIMBRA, C.C.B.E. Lúpus eritematoso sistêmico: incidência e tratamento em mulheres. REVISTA UNINGÁ REVIEW, [S.l.], v. 20, n. 1, jan. 2018. ISSN 2178-2571. Disponível em: <http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1562>. Acesso em: 25 jul. 2019.