Trabalhos Científicos

Título: Sarcoidose De Início Precoce Na Infância

Autores: JANINE MAGALHÃES CARNEIRO (COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS)

Resumo: Introdução: O objetivo desse relato de caso é descrever a manifestação cutânea da Sarcoidose conduzindo ao diagnóstico de uma doença sistêmica, rara na faixa etária pediátrica. Descrição do caso: Paciente feminina, 16 anos, previamente hígida, iniciou aos 3 anos de idade com lesões cutâneas eritemo-violáceas atróficas, em região malar de face e posteriormente em membros inferiores, de aumento progressivo, associada a tosse seca crônica, sem dispneia. Após 10 anos sem diagnóstico, a partir da realização de uma biópsia cutânea das lesões, o anatomopatológico e a imuno-histoquímica foi compatível com sarcoidose cutânea. Pesquisa de Ziehl e Grocott negativos. Culturas para BK e para fungos negativas. Baciloscopias negativas, PPD não reator. Rdiografias de tórax normais. Vinha em uso de tracolimus tópico nas lesões cutâneas. Apenas após realização de tomografia computadorizada de tórax que revelou achados pulmonares compatíveis com a sarcoidose, excluídas outras doenças e acometimento de outros órgãos, iniciou tratamento com drogas imunossupressoras. Faz uso de hidroxicloroquina 400mg/dia, metrotexate 10mg/semana, prednisona 40mg/dia e azatioprina 100mg/dia. Paciente evoluiu com melhora das lesões cutâneas e da tosse crônica após início do tratamento. Discussão: A sarcoidose é uma doença inflamatória sistêmica, de etiologia indefinida, sendo rara na infância. A manifestação cutânea ocorre em 20 a 35 dos casos possibilitando o diagnóstico precoce pela facilidade de realização da biópsia. Viabilizando o início precoce do tratamento e a investigação do acometimento de outros sistemas. Conclusão: A sarcoidose é incomum nos pacientes pediátricos e o quadro clínico pode variar daquele encontrado em adultos, sendo frequentemente não diagnosticada. A real incidência da doença em crianças é incerta e existe a possibilidade de que o manejo e as indicações de tratamento sejam diferentes.