



Trabalhos Científicos

Título: Edema Agudo Hemorrágico Da Infância: Um Relato De Caso

Autores: DANIELLE MAYUMI NAKANO (HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO), ANDREA SAYURI MURATA (HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO), HELOISE COSTA E SILVA (HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO), BIANCA DE OLIVEIRA LIMA (HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO), ALINE ADELINA SOARES NOVATO (HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO), LÍVIA MANOLIO FRANCO (HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO), VICTORIA HERNANDEZ GIRNYS (HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO), MONIQUE MARIA STEFFEN (HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO)

Resumo: INTRODUÇÃO Edema agudo hemorrágico da infância (EAHI) é uma vasculite pouco frequente que acomete pequenos vasos, com prevalência em crianças entre quatro meses e dois anos de idade. Suas causas são ainda desconhecidas e alguns autores acreditam ser uma forma exclusivamente cutânea da púrpura de Henoch-Schoenlein (PHS). DESCRIÇÃO DO CASO Lactente do sexo masculino, quatro meses, apresentou quadro de lesões purpúricas palpáveis e indolores de início súbito, há um dia, com aparecimento de lesão em pavilhão auricular, progredindo para face e membros, acompanhado de edema em mãos e pés. Relatada ausência de prurido ou febre. Quadro precedido, há uma semana, por infecção de vias aéreas superiores. Exames complementares: eritrograma, leucograma, plaquetas, coagulograma, função renal e velocidade de hemossedimentação normais. Coletado líquido cefalorraquidiano sem alterações. Sorologias para toxoplasmose, rubéola e hepatite C não reagentes. Complemento (C3 e C4) dentro do limite de normalidade. Pesquisa de autoanticorpos anticélula (FAN), fator reumatoide e anticorpo anti-neutrófilos (ANCA) normais. Pesquisa de sangue oculto nas fezes positivo. Realizada biópsia de pele com vasculite leucocitária de pequenos vasos. DISCUSSÃO O EAHI é caracterizado por febre, lesões purpúricas na face, pavilhão auricular e extremidades, juntamente com edema, tem surgimento súbito e geralmente é precedido por quadro infeccioso. O curso da doença é de caráter benigno, com resolução espontânea em uma a três semanas. Seu diagnóstico é essencialmente clínico, porém quando realizada biópsia, apresenta-se com achados compatíveis com vasculite leucocitoclástica, com acometimento de pequenos vasos da derme. Apesar do paciente não apresentar febre, as lesões eram típicas, com biópsia compatível com EAHI. CONCLUSÃO O EAHI é uma doença rara de caráter benigno, porém devido ao seu aspecto clínico, preocupa o médico que desconhece a doença e por isso se faz importante seu conhecimento e seus diagnósticos diferenciais como PHS, meningococcemia, síndrome de Sweet, doença de Kawasaki e outros.