



Trabalhos Científicos

Título: Associação Entre O Desenvolvimento Neuropsicomotor, Diagnóstico Nutricional E Alimentar De Lactentes Atendidos Em Uma Unidade Básica De Saúde

Autores: ANNIE CHINEYE UZÔMA ARÊDA OSHAI (UFPA), LAURA MIELCZARSKI GOMES SOARES (FURB), DANILO SOUSA DAS MERCÊS (UFPA), AMANDA CAROLINA ROSARIO PANTOJA (UFPA), LORRANA DE SOUZA AZEVEDO (UFPA), PAULO ROGÉRIO PORTAL MELO (UFPA), WAGNER COSTA FREITAS (UFPA), JORGE ALEXANDRE PEREIRA MENDES (UFPA), BRENDA CAROLINE RODRIGUES (UFPA), ALINE KELLEN DA SILVA SALGADO (UFPA), FABÍOLA VASCONCELOS DA SILVA (UFPA), MARCELLO JOSÉ FERREIRA SILVA (UFPA)

Resumo: Introdução: Por ser este o período de intenso crescimento e amadurecimento do tecido nervoso, torna-se indispensável acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor (DNP) nos primeiros dois anos de vida do indivíduo. Objetivo: avaliar a relação entre o desenvolvimento neuropsicomotor e o diagnóstico nutricional e alimentar de lactentes atendidos em uma Unidade Básica de Saúde. Método: Foi realizado um estudo retrospectivo, quantitativo, descritivo de dados obtidos de prontuários de pacientes no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Foram incluídas no estudo lactentes cujos formulários apresentavam informações integralmente preenchidas acerca do diagnóstico nutricional, alimentar e neuropsicomotor. Resultados: do total de 326 crianças investigadas, 180 (55,2) eram do sexo feminino, 316 (97) apresentaram DNP adequado para a idade, 300 (92) foram classificados como eutróficos – apesar de 200 (61,3) apresentarem erros alimentares qualitativos e/ou quantitativos. Entre os que tinham atraso do DNP, 3 eram eutróficos por mais que apenas 2 não tivessem erros alimentares. Em relação ao peso ao nascer, 268 (82,2) nasceram com mais de 2.500 gramas. Conclusão: Embora mais da metade dos pacientes avaliados neste estudo tenha apresentado erros alimentares, a maioria foi classificada como eutrófica e apresentou DNP adequado para a idade. O desenvolvimento neuropsicomotor é dinâmico e está susceptível a influência de fatores biológicos e ambientais, tornando necessária uma avaliação constante com o intuito de identificar precocemente quaisquer alterações. Além disso, torna-se importante ressaltar que a exposição a fatores de risco pode ter repercussão mais tardia, se manifestando na fase escolar e adolescência.