



Trabalhos Científicos

Título: Influência Do Ambulatório De Seguimento Dos Prematuros Na Manutenção E Recuperação Da Lactação

Autores: JULIANA CARVALHO TAVARES ALVES (UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO), LÉLIA CARDAMONE GOUVÊA (UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO), SUSANNE ANDRADE BLANC BERTRAND (UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO), RENATA IGLESIA MOLINA (UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO), MARIANA XAVIER CIUFFATELLI (UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO), MARIA CAROLINA BLANCO DA ROCHA BRAGA (UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO), MARCIA REGINA SILVA DE SOUSA (UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO), CARLOS EDUARDO CASTRO COSTA (UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO), LUCAS DE BRITO COSTA (UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO)

Resumo: Introdução: A prematuridade associa-se a complicações e o aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento do lactente principalmente nos primeiros seis meses de vida. No Brasil 10 dos recém-nascidos são prematuros. Objetivo: Identificar na primeira consulta ambulatorial o tipo de aleitamento, sua relação com a idade gestacional, o tempo de internação e a evolução no seguimento ambulatorial por seis meses. Método: Estudo observacional transversal, realizado após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, com análise dos prontuários do ambulatório de prematuros (PT). Critérios de inclusão: 37 semanas, idade de até 4 meses na primeira consulta e ter seguimento por quatro ou mais consultas sequenciais. Classificação por idade gestacional: PT extremo (28 semanas), PT moderado (28-33 semanas) e PT tardio (34 a 36 semanas). Tipo de aleitamento: Aleitamento materno exclusivo (AME), aleitamento misto (AM) e aleitamento artificial (AA). Resultados: Obtivemos 26 prontuários. 12 chegaram em AME (46,15), 5 AM (19,23) e 9 AA (34,61). Foi oferecida a relactação. Os PT em AM, 4 recuperaram a lactação para AME (80). Os PT em AA, só um recuperou a lactação (11,11). Analisando o tempo de internação e o tipo de aleitamento na primeira consulta: AME 17 dias, AM 28 dias, AA 55 dias. A idade mediana da primeira consulta conforme o tipo de aleitamento: AME (1 mês e 21 dias), AM (2 meses e 27 dias), AA (2 meses e 11 dias). Quanto a idade gestacional no grupo AME (9 PT tardio, 2 PT moderado e 1 PT extremo), grupo AM (2 PT tardio, 2 moderados e 1 extremo), grupo AA (1 PT tardio, 4 moderados e 4 extremos). O acompanhamento ambulatorial até o sexto mês aumentou de 45,15 o AME para 65,38, com a relactação. Conclusão: O acompanhamento ambulatorial especializado pode interferir positivamente na manutenção e recuperação da lactação entre os prematuros.