



Trabalhos Científicos

Título: A Prática Do Aleitamento Materno E As Dificuldades Relacionadas Em Crianças Portadoras De Fissuras Labiopalatinas.

Autores: AMANDA CRISTINA DA SILVA SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM), BRUNO PINHO MINEIRO GONÇALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM), YASMIM SOUZA DE VASCONCELOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** As fissuras labiopalatinas (FLP) são malformações congênitas de elevada incidência e com origem embriológica. As características anatômicas das FLP comprometem e dificultam o processo de amamentação em seus portadores. **OBJETIVOS:** Compreender a prática do aleitamento materno em crianças com FLP, sua importância e as dificuldades envolvidas nesse processo. **METODOLOGIA:** Revisão bibliográfica realizada através de busca nos bancos de dados Scielo, Google Acadêmico, Pubmed e LILACS, utilizando os seguintes descritores: fendas orofaciais, crianças, aleitamento materno. Este estudo possui características descritivo-exploratórias com abordagem qualitativa, incluindo trabalhos publicados nos últimos 10 anos. **RESULTADOS:** Apesar de suas alterações anatomofuncionais, a FLP não inabilita a criança quanto ao aleitamento materno nem à alimentação, uma vez que os reflexos de sucção e deglutição se encontram preservados. O incentivo ao aleitamento materno é tido como orientação básica, por seus valores nutricional e imunológico, auxiliando no combate à infecções, como as de orelha média, comuns nos portadores de fissura. É essencial no fortalecimento do vínculo materno-infantil, além de favorecer o aumento da força dos movimentos executados pela língua e o desenvolvimento da musculatura orofacial. Contudo, a efetividade e a duração deste dependem da estimulação da mãe e do grau de complexidade da fissura, sendo que quanto mais complexa a fissura, mais precoce costuma ser o desmame, decorrente, principalmente, da sucção ineficiente e do refluxo de leite para a cavidade nasal. Na impossibilidade da amamentação, existem várias formas alternativas de aleitamento. Porém, não há um consenso na literatura sobre a forma mais adequada, tornando a orientação às mães um fator inerente ao sucesso do aleitamento. Entretanto, essas orientações são realizadas, majoritariamente, de modo insuficiente e inadequado. **CONCLUSÃO:** A importância do aleitamento materno repercute no crescimento e desenvolvimento global das crianças portadoras de FLP e sua efetividade está atrelada à complexidade da fissura e às orientações realizadas aos cuidadores.