



Trabalhos Científicos

Título: Características Dos Pacientes Com Doença Inflamatória Intestinal Seguidos No Ambulatório De Gastropediatria Em Um Hospital Infantil De Referência

Autores: ELIANA VIDOLIN (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS), LIANE GUIDI OKAMOTO (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS), OHANNA GUERRA BARBALHO (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS), ANALICE ALMEIDA ANDRADE (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS), MARINA AZEVEDO DIAS (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS), VANESSA RIOS MELO SILVA (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS), ELIENE NOVAIS OLIVEIRA (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS), ALINE FALLEIROS DE FREITAS (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS), DALETH RODRIGUES SCARAMUZZI (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS), LUISA MARIA DE MORAIS HOLANDA (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS), PALOMA EMANUELLA DE JESUS FERNANDES (HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS)

Resumo: Objetivos: Caracterizar os pacientes com doença inflamatória intestinal (DII), seguidos no ambulatório de gastropediatria, em Hospital Infantil de referência. Métodos: Estudo descritivo, transversal por revisão de prontuários no período entre janeiro/2012 a abril/2019. Utilizaram-se critérios clínicos, endoscópicos e histológicos para diagnóstico. Foram estudadas as variáveis: sexo, antecedentes familiares, idade do início dos sintomas e diagnóstico, intervalo de tempo entre sintomatologia e diagnóstico, sinais e sintomas iniciais, doenças associadas, padrão colonoscópico, estado nutricional e classificação de gravidade. Resultados: Incluídas 32 crianças, média 3,5 novos casos/ano, pico em 2016 e 2017 com 6 casos/ano. Doença de Crohn(DC), 40,6 e Retocolite Ulcerativa(RCUI), 59,4. Na DC, são sexo feminino, 69,2 e RCUI, 47,3. Não houve antecedente familiar para DII. A idade de início dos sintomas variou entre 7-195 meses, mediana de 111,5 meses. A mediana de tempo entre início dos sintomas e diagnóstico foi 4 meses. Queixa inicial mais frequente: diarreia sanguinolenta 68,7, seguida de dor abdominal 34,3 e diarreia sem sangue 18,7. Tinham IMC menor que escore z-2, 46,8. Lesão perianal 25, exclusivamente DC. Anemia 30 e manifestações extraintestinal, 40. Colangite esclerosante foi a única doença associada, encontrada em 21,8, apenas nos pacientes com RCUI. De acordo com a Classificação de Montreal, 68,4 das RCUI apresentaram padrão colonoscópico de pancolite e 31,5, colite a esquerda. Na DC, 7,6 mostrou comprometimento do trato gastrointestinal superior, 30,7 ileocolônico e 7,6 não classificável. Conforme o Pediatric Crohn's Disease Activity Index, 84,6 classificaram-se de moderada a grave. Na RCUI, de acordo com o Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index, 21 classificaram-se grave, 63,1 moderada e 15,7 leve. Conclusão: Nossos resultados concordam com dados da literatura mundial, sendo discrepante em relação ao sexo predominante na DC (masculino na maioria dos estudos). Diarreia foi o sintoma mais encontrado, em ambos os tipos, discordando de outros estudos, que apontam a dor abdominal como principal sintoma.