



Trabalhos Científicos

Título: Tuberculose Pulmonar Em Lactente

Autores: AMANDA LOPES RIBEIRO (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA), SUSANA CAVASINI GUERRA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA), CAMILLA GARCEZ COSTA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA)

Resumo: INTRODUÇÃO O Brasil é um dos países com maior número absoluto de casos de tuberculose (TB) no mundo, porém os dados epidemiológicos sobre TB infantil são escassos. A TB infantil possui suas mais altas taxas de incidência entre os contatos de adultos bacilíferos. **DESCRIÇÃO DO CASO** Lactente, masculino, 4 meses, internado devido a tosse seca iniciada há 15 dias, febre há 5 dias e pústula em mento. Estava em tratamento de pneumonia, sem melhora. Avô materno falecido há 5 anos com diagnóstico de tuberculose. Investigado familiares, diagnosticado primo e realizado tratamento. Apresentava-se em regular estado geral, linfonodo pré auricular palpável e edema em região mandibular direita, ausculta respiratória com murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios e sem esforço respiratório. Em exames laboratoriais, anemia hipocrômica e microcítica, leucocitose sem desvio à esquerda, PCR aumentado e imagem radiológica sugestiva de cavitação. Utilizado esquema inicial com ceftriaxona e oxacilina por 8 dias. Evoluiu afebril, porém manteve linfonodomegalia pré auricular. Em TC de tórax, aumento de linfonodos peritrapeais, hilares e subcarinais, nódulos pulmonares e áreas de cavitação esparsas pelo parênquima pulmonar. Realizado investigação para Tuberculose Pulmonar (TP) com pesquisa de BAAR, com segunda amostra positiva. Iniciado rifampicina, isoniazida e pirazinamida. **DISCUSSÃO:** Os achados clínico-radiológicos de TP na infância são pouco característicos, com manifestações variáveis. Há dissociação clinicoradiológica. Em casos de imagem de cavitação, a possibilidade de se tratar de TB deve ser aventada. Em relação a crianças que convivem com pessoas tuberculosas, é necessário identificar possíveis doentes que estejam passando despercebidos. **CONCLUSÃO** Apesar de escassos investimentos destinados à saúde, o controle de comunicantes é uma medida preventiva importante no controle da TB, pois além de possibilitar o diagnóstico em fase inicial da doença, permite sua prevenção. Ressalta-se ainda a importância de incluir TP no diagnóstico diferencial de lactentes com sintomas respiratórios prolongados, bem como a investigação de contatos.