Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso: Complicações Graves De Uma Doença Comum - Vasculite E Fasceíte Necrotizante Pós Varicela

Autores: THAMARA LIMA RIBEIRO (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), FRANÇOIS LOIOLA PONTE DE SOUZA (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), LUCAS LOIOLA PONTE ALBUQUERQUE RIBEIRO (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA), MARIANA BRAATZ KRUEGER (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), ÍTALO OLIVEIRA DE QUEIROZ (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), NATÁLIA FREITAS FRANCELINO DIAS (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), MÁRCIA PEREIRA DE OLIVEIRA (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), ANA PAULA RODRIGUES SALGUEIRO (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), NAYARA SOBREIRA BRAGA (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), MAYARA NATÉRCIA VERÍSSIMO DE VASCONCELOS (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN)

Resumo: INTRODUÇÃO Varicela é uma infecção causada pelo vírus varicela-zóster, bastante comum na faixa etária pediátrica. Apresenta um curso autolimitado, mas pode estar associada a complicações graves, mesmo em pacientes imunocompetentes. DESCRIÇÃO Feminino, 7 anos, apresentava exantema polimórfico típico de Varicela que evoluiu após cinco dias do início do quadro, com lesões ulceradas, enegrecidas, purulentas, dolorosas em orelha e região infraclavicular esquerda, características de fasceíte necrotizante. Iniciado antibioticoterapia e aciclovir endovenosos e realizado debridamento cirúrgico, evoluindo com melhora do quadro. Durante internamento hospitalar apresentou queixa de turvação visual importante, sendo realizado ressonância e angioressonância de encéfalo que confirmaram a hipótese de vasculite por Varicela. DISCUSSÃO Uma das importantes complicações da Varicela é a fasceíte necrotizante, caracterizada por destruição rápida e necrose da fáscia muscular e tecido subcutâneo, podendo atingir epiderme. Deve sempre ser considerada ao observarmos eritema, calor e indução da pele e tecidos moles, associado a uma recorrência da febre ou à sua persistência após o 4º dia do início do exantema. Já a vasculite por varicela pode representar, em crianças, cerca de 31 de todos os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, podendo surgir semanas a meses após o início da infecção. CONCLUSÃO Devido as possíveis complicações graves, reforçamos a necessidade de vacinação contra varicela, pois apenas 1 dose da vacina é capaz de prevenir mais de 97 dos casos graves.