



Trabalhos Científicos

Título: Frequência De Torchs Notificados Segundo Bairro De Residência E Ano Em Um Município Entre Os Anos De 2014 A 2018

Autores: VICTOR FERNANDO COSTA MACEDO NORONHA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), SYLVIA KATHARINY FARIAS ANDRADE (UNIVERSIDADE TIRADENTES), NATHALIA COSTA MACEDO NORONHA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), LUCAS ALVES BEZERRA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), EVLYN KAROLAYNE BISPO ANDRADE (UNIVERSIDADE TIRADENTES), TERESA VIRGÍNIA NEVES FLORIANO (UNIVERSIDADE TIRADENTES), ANNY CAROLYNE OLIVEIRA LIMA SANTOS (UNIVERSIDADE TIRADENTES), RAFAELLA CASTRO GAMA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), ADRIANA BARBOSA DE LIMA FONSECA (UNIVERSIDADE TIRADENTES)

Resumo: Introdução: Infecções congênicas e perinatais, conhecidas como TORCHS, constituem um importante problema de saúde pública e trazem prejuízos para o feto e recém-nascido. Retratam uma causa relevante da mortalidade fetal e neonatal e da morbidade na infância. Objetivos: Avaliar o perfil epidemiológico das infecções que constituem o acrônimo TORCHS e traçar uma relação entre bairro de residência e ano de ocorrência no período de 2014 e 2018 no município de Aracaju-SE. Metodologia: Análise quantitativa de cunho descritivo, transversal e retrospectivos de dados referente a TORCHS em Aracaju-SE. Resultados: Constatou-se um aumento constante entre 2016 e 2018 (20,07, 21,97 e 22,67, respectivamente) e com a menor taxa em 2015 (15,02). Os bairros Santa Maria e Santos Dumont foram responsáveis por 21 (10,99 e 10,01, respectivamente) das notificações válidas, seguidos do Porto Dantas (6,40), América (4,59) e Cidade Nova (4,59). As menores taxas foram encontradas nos bairros Jardins, 13 de Julho e Jabotiana com apenas 1 notificação nos 5 anos. Conclusão: A notificação das infecções perinatais foi mais expressiva nos bairros mais carentes do município. Logo, se pode inferir que o nível educacional e socioeconômico da família influencia na prevenção dessas patologias. Assim, com o acesso adequado aos serviços de saúde para o planejamento da concepção e durante o pré-natal são eficazes para diminuição das taxas encontradas.