



Trabalhos Científicos

Título: Associação De Vacterl

Autores: JÚLIA PIANO SEBEN (UFFS, HSVP), GIANI CIOCCARI (UFFS, HSVP), SIMONE MEDEIROS BEDER REIS (UFFS, HSVP), ROBERTO MOREIRA MACHADO (UPF, HSVP), FERNANDA WINKELMANN (UFFS, HSVP), NATÁLIA PIANO SEBEN (UNISUL), CLÁUDIA COMIN PIETROBIASI (UFFS, HSVP), JÚLIA GELLER EIDT (UFFS, HSVP), LAÍS ANTUNES DE LIMA (UFFS, HSVP), DANIELA DOS SANTOS ALBARELLO (UFFS, HSVP)

Resumo: Associação de VACTERL é um mnemônico que agrupa as seguintes alterações: defeitos vertebrais, atresia anal, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, displasia radial ou renal, malformações cardíacas e anomalias ósseas. Apesar de rara, apresenta alta morbimortalidade desde o nascimento. O diagnóstico precoce e o tratamento adequados reduzem esses riscos. Recém-nascido de parto vaginal, masculino, idade gestacional de 36 semanas, peso 2,21kg, Apgar 9/10 e história de polidrâmnia evidenciada em ultrassonografia realizada no terceiro trimestre gestacional. Encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo para estabilização clínica em CTI e correção cirúrgica de ânus imperfurado. Na chegada, apresentou vômitos e engasgos. O insucesso da sondagem orogástrica aventou a hipótese de atresia esofágica e fístula traqueoesofágica. Realizados exames de imagem onde identificou-se perfuração de reto com formação de pneumoperitônio. Realizado colostomia em duas bocas e colorrafia. No dia seguinte procedeu-se a correção de atresia de esôfago e correção de fístula esofágica distal. Paciente evoluiu com sepse tardia e meningite sendo mantido em CTI até estabilização do quadro. Ecografia transfontanelar identificou hidrocefalia. Realizada derivação ventrículo-peritoneal. Na sequência, evoluiu bem e foi transferido para enfermaria para assegurar estabilização e maiores investigações. Aventada a possibilidade de Sequência de VACTERL, solicitado ultrassonografia de abdômen total e radiografia de coluna cervical, torácica, lombar e membros. Identificou-se agenesia renal à esquerda e agenesia sacral. Realizado, por fim, ecografia de coluna lombar para investigação de alterações neurológicas, com resultado negativo. Permaneceu internado por poucos dias e recebeu alta hospitalar, com retorno ambulatorial. A Associação de VACTERL envolve a presença de múltiplas anomalias congênicas, sendo diagnosticada pela presença de pelo menos três acometimentos. O manejo desses pacientes deve ser realizado em centros especializados visando a correção cirúrgica das manifestações congênicas já no período neonatal imediato prevenindo assim complicações futuras. O prognóstico é relativamente positivo, pois habitualmente não há comprometimento neurológico.