



Trabalhos Científicos

Título: Teratoma Sacrococcígeo: Relato De Caso

Autores: ANDRÉ DA SILVA SIMÕES (HMIB DF), BEATRIZ REIS AFONSO (UNICEUB DF), BRUNA ALVES DAS OLIVEIRAS (UNICEUB DF), LUIZ FELIPE FALCÃO DE SOUZA (UNICEUB DF), LORENA DE MELLO FERREIRA SILVA ANDRADE (HMIB DF), MARTA DAVID ROCHA DE MOURA (HMIB DF)

Resumo: Introdução: Teratomasacrocígeo é um tumor oriundo de células da linha primitiva, podendo conter tecidos da ectoderme, da endoderme e da mesoderme. Pode ser maligno ou benigno Este trabalho tem por objetivo relatar o caso de paciente recém-nascido com teratoma sacrococcígeo. J.T.F.G, sexo feminino, nascida de parto cesáreo sem intercorrências, a termo, pesando 3335 g, estatura de 46 cm, perímetro cefálico de 34 cm e APGAR 8 e 9, nos primeiro e quinto minutos. Prescreveu-se hidratação venosa, e a dieta iniciou-se no segundo dia de vida, por sonda orogástrica. Realizado diagnóstico pré-natal de teratoma sacrococcígeo, predominantemente cístico e extrapélvico, com extensão para a região pré-sacral em contato com o cóccix. A massa possuía aproximadamente 20 cm de diâmetro, em região sacral, era pouco epitelizada e possuía centro necrótico. Fora encaminhada para unidade de terapia intensiva para receber os cuidados adequados. Teve cirurgia realizada no terceiro dia de vida, com ressecção do teratoma sacrococcígeo, além do cóccix e de componente pré-sacral, sendo realizada aproximação da musculatura perineal e síntese da pele na linha média. Não houve complicações. Mantida com dieta zero durante três dias após a cirurgia. Apresentou oscilações na glicemia, com posterior normalização, além de icterícia. No quarto dia do pós-operatório, já em uso de nutrição parenteral total, foi reiniciado dieta com leite humano do banco por sonda orogástrica, com boa aceitação. Liberada ao seio materno, no nono pós – operatório, apresentou dificuldade de sucção, evoluiu com melhora clínica recebendo alta no 21 dia de vida em aleitamento materno exclusivo.