Trabalhos Científicos

Título: Atresia Duodenal Por Pâncreas Anular Associado Com Duplicação De Íleo Terminal

Autores: JULIANA ROQUE DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO/AC), NICOLAS WILLIAN GALDINO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO/AC), JOSENEIDE MARIA FEITOSA DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO/AC), FERNANDA LAGE LIMA DANTAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO/AC), CEZAR LUÍZ MAGALHÃES PINHEIRO (MATERNIDADE BÁRBARA HELIODORA, RIO BRANCO/AC), BÁRBARA ROQUE (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE, RIO BRANCO/AC), LARISSA CUNHA CORDEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO/AC), CARLA KARINY CANTUÁRIA BRAGA PONTES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO/AC), MARIANA RAMOS BARBOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO/AC), ANNELISE BIANCA REIS DE ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO/AC), ALANA SPERANDIO PORTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO/AC), JAKELINE MOREIRA MACHADO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO/AC), BRUNA PEREIRA FARIAS (HOSPITAL DA CRIANÇA, RIO BRANCO/AC), JANISON BEZERRA DOS SANTOS (MATERNIDADE BÁRBARA HELIODORA, RIO BRANCO/AC), MARIA DO SOCORRO AVELINO GONÇALVES (MATERNIDADE BÁRBARA HELIODORA, RIO BRANCO/AC), SARA RODRIGUES PEREIRA (MATERNIDADE BÁRBARA HELIODORA, RIO BRANCO/AC), CHARLENE CRISTINE RODRIGUES MENEZES (HOSPITAL DA CRIANÇA, RIO BRANCO/AC), LUISVALDO RODRIGUES DA SILVA (MATERNIDADE BÁRBARA HELIODORA, RIO BRANCO/AC)

Resumo: Introdução: A atresia duodenal é uma patologia associada a anomalias congênitas, uma das principais diferenças entre atresia duodenal e outras atresias mais distais é a óbvia complexidade da má formação duodenal e sua alta incidência na síndrome de Down. Neste relato, descreveremos um caso de obstrução duodenal alta por pâncreas anular associado com uma duplicação total de íleo não relatada na literatura médica clássica, o presente estudo visa a discussão de tal associação e o tratamento aplicado. Descrição do caso: Um caso de duplicação de jejuno associada a uma atresia duodenal por pâncreas anular em um paciente sabidamente portador de síndrome de Down. O paciente foi submetido a cirurgia corretiva com duodenostomia "Diamond Shaped", durante exploração dos segmentos distais foi notado um apêndice em fundo cego em porção terminal do íleo, próximo a válvula ileocecal, ao ressecar o apêndice foi notado uma porção de musculo liso intraluminal, condizendo com uma duplicação de íleo, a conduta tomada foi a enterectomia segmentar da região do coto terminal em fundo cego, seccionando uma porção pequena (menos de 2 cm) do íleo, dado que a duplicação era total e a ressecção de toda porção afetada daria origem a uma síndrome de intestino curto no paciente. Discussão: Apesar da atresia duodenal estar intimamente ligada aos casos de síndrome de Down, a associação destas alterações com duplicação entérica é algo não relatado em literatura médica, a importância do caso não se limita somente ao fato da duplicação de íleo ser um achado acidental. Conclusão: O caso demonstra de maneira prática a razão de ser necessária uma exploração minuciosa de todo o trajeto das alças intestinais, no intra operatório, para garantir que nenhuma alteração do trajeto, não observada nos exames de imagens, devido a não progressão do contraste, fique sem devida correção.