



Trabalhos Científicos

Título: Síndrome De Stevens-Johnson Como Diagnóstico Diferencial De Conjuntivites

Autores: SUSANA CAVASINI GUERRA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA), CAMILLA GARCEZ COSTA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA), GIOVANNA MAGRI LASALVIA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA), KARLA SUCUPIRA MOTA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA), MORGANA MORENO BOSCHI (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA), VERENNA DE FARIA ALVARENGA (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA), REINALDO CAZISSI (SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA)

Resumo: Introdução: A Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) pode ser definida como um quadro fisiopatológico de uma afecção inflamatória aguda, febril e autolimitada, que afeta pele e mucosas. Casos são estimados em 1,2 a 6 milhões /ano, sendo 5 fatais. Relato: FA, dez anos, com quadro lesões vesiculares e aftoides em cavidade oral e em lábios há 1 dia, iniciado após quadro de infecção de via aérea superior. Aventado hipótese de herpes e iniciado aciclovir. Posteriormente, iniciou hiperemia e secreção em olhos, consultado oftalmologista e iniciado tratamento para conjuntivite com antibiótico tópico. Evoluiu com febre, piora de lesões prévias, aparecimento de úlcera em prepúcio, bolha em pênis, inapetência, desidratação e leucocitúria. Optado por internação hospitalar e iniciado ceftriaxona. Evoluiu com lesões ulceradas, sangrantes e necróticas em cavidade oral, olhos com intensa hiperemia e secreção amarelada, além de surgimento de lesões circunscritas, eritematosas e bolhosas em corpo. Com cerca de 10 dias de evolução, iniciou melhora de lesões e de aceitação alimentar. Discussão: A SSJ inicia-se geralmente após o uso de medicações ou ocorrência de infecções. Em crianças é associado com recente infecção do trato respiratório superior. O envolvimento mucoso é, em geral, polimórfico e grave, o que pode dificultar a ingestão oral com consequentes desidratação e desnutrição, fatores que pioram o prognóstico. O acometimento ocular ocorre em 35 a 60 dos casos. Destes, 78 inicia com conjuntivite logo no primeiro dia. Conclusão: Devido ao grande potencial de gravidade e complicações, salientamos com o presente relato a importância de se pensar em SSJ em casos de conjuntivites bilaterais em associação com lesões em cavidade oral, bem como a relevância de estudos de casos de SSJ como meios difusores para aumento da suspeita clínica e de diagnósticos tanto entre oftalmologistas como entre médicos não especialistas.