



Trabalhos Científicos

Título: Suplementação De Sulfato Ferroso Em Lactentes.

Autores: GABRIELA BUSSAD PIRES (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), CAMILA COSTA FILIPPE KAMHAJI COSTA FILIPPE KAMHAJI (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), ISABELA BRAGA TRANI FERNANDES (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), GABRIELLA SANT ANNA TELES (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), IARA RIBEIRO DE SOUSA GOMES PEREIRA (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), LUIZA DE OLIVEIRA SOBREIRO (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), NATÁLIA BONFIM DOS SANTOS (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), BEATRIZ ESTEVES MONTEIRO ESTEVES MONTEIRO (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), LAURA ARTIOLI DE MORAES E SOUZA (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), JESSICA BARONE SANGINETO ROCHA (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), LUIZA FALCÃO NANO (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), TATIANA PEREIRA RODRIGUES (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), ATHINA SALIM SAUD (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), GESIANE DA SILVA LOUREDO DA SILVA LOUREDO (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES), GLÁUCIA MACEDO DE LIMA (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES)

Resumo: O Programa de profilaxia da Anemia em lactentes recomenda suplementar sulfato ferroso entre seis e 24 meses de vida. Recentemente foi antecipado o início desta recomendação para os tres meses. O objetivo do estudo é o de observar possíveis relações da oferta do suplemento em vigência de aleitamento materno. Métodos: Análise de dados demográficos obtidos de Questionários aplicados a 170 mães de lactentes, referentes à gestação e nascimento de seu filho. Variáveis categóricas analisadas com Qui quadrado, Teste t para as contínuas e significância 0,05. Resultados: Prevalência de residentes nas Zonas Oeste e Norte RJ 88,8, União estável 54,7, Média 1 filho lactente atual 89,4, Idade 15- 41 anos, Média 25,55 + 6,66, Escolaridade 1-25 anos de estudo, Média 10,06 + 3,40, sendo 44,7 Ensino Fundamental até 9, Ensino Médio 38,2 até 12, Superior 7,8 12 anos estudo. Atividade profissional: “no lar” 32,4, doméstica 11,2, comércio 28,2, Saúde 8,2, Educação 4,7, Estudante 8,2, Administrativo 5,3, Engenheira 0,6, Advogada 1,2. Empregadas 51,2, Renda: 0-20 salários, média 2,61 + 2,91. Idade Gestacional: 26-42 semanas, média 38 + 2,68. Peso 0,7- 5,2 Kg, média 3,08 + 0,72. Aleitamento 0-7 meses: Média 3,53 + 2,06, Início do Sulfato ferroso de 0-8 meses, média 2,73 + 2,39. À correlação do Sulfato ferroso, se antes ou após 6 meses, p 0,05 com a oferta antes dos 6 meses com: Idade materna 25, Escolaridade superior a 12 , Mais de 6 consultas Pré-natais, Funcionárias da saúde, Parto a termo, oferta do suplemento sem diluição e Desmame. Conclusão: Embora com amostra aleatória, que não possibilita verificar co-variáveis implicadas, como retorno ao trabalho, por exemplo, a utilização da nova recomendação de profilaxia da anemia antes dos 6 meses, foi observada nesta pesquisa em lactentes de mães experientes e coincide a utilização do suplemento com desmame.