



Trabalhos Científicos

Título: Identificação Precoce De Atraso No Desenvolvimento Através Do Uso Da Caderneta De Saúde Da Criança: Um Relato De Caso

Autores: LUANA FREIRE GÓES LIMA (IMIP), MAYARA BATISTA GRANHA (IMIP), LUCIA HELENA GUIMARÃES RODRIGUES (IMIP), NATALIA DINIZ HAZBOUN SIQUEIRA (IMIP), THAÍS TEIXEIRA ALCÂNTARA (IMIP), LARISSA VIRGÍNIA FERREIRA SILVA (IMIP), NATÁLIA SOARES MACHADO RIBEIRO (IMIP)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** Compreende-se por desenvolvimento um processo dinâmico, cujas funções são identificadas em habilidades e comportamentos nas dimensões física, intelectual, emocional e social. A caderneta de saúde da criança (CSC) permite o acompanhamento dos marcos de desenvolvimento, devendo ser utilizada na consulta de puericultura. **DESCRIÇÃO DO CASO:** R.E.A.F., feminino, 1 ano, nascida de parto cesáreo, a termo, Apgar 6 e 8, com internamento por Sepsis Neonatal Precoce. Em consulta de puericultura aos dois meses, atingia os marcos esperados para a faixa etária. Aos três meses, foi identificada hipotonia axial, sem alterações fenotípicas, com perímetro cefálico adequado. Realizada ultrassonografia transfontanela, que não evidenciou anormalidades. Iniciada fisioterapia motora e estimulação precoce em domicílio. Aos cinco meses, detectado “atraso do desenvolvimento provável”, sendo solicitadas avaliação auditiva e Ressonância Nuclear Magnética (RNM) de encéfalo, evidenciando atraso na mielinização da substância branca. Aos sete meses, foi notada ausência de quatro marcos esperados para a faixa etária e de um marco da faixa anterior. Encaminhada ao Centro de Reabilitação para acompanhamento multidisciplinar. Aos doze meses, atingiu todos os marcos esperados, sendo classificada como desenvolvimento adequado para idade. **DISCUSSÃO:** O atraso de desenvolvimento pode ser uma condição transitória, ou associar-se a hipóxia, sepsis, malformações de sistema nervoso central, dentre outras condições. Neste caso, através da CSC, foi possível identificar a sepsis como fator de risco e registrar alteração de tônus muscular e a não aquisição dos marcos esperados desde os três meses de vida. Apesar da identificação de atraso de mielinização à RNM, a intervenção com fisioterapia e orientação à família resultou na aquisição de todos os marcos aos doze meses. **CONCLUSÃO:** A CSC é um importante instrumento de vigilância do desenvolvimento infantil, visto que a identificação e estimulação precoces resultam em melhores desfechos. No caso relatado, houve recuperação do desenvolvimento em nove meses de acompanhamento e intervenção.