



Trabalhos Científicos

Título: Análise Do Conhecimento De Diferentes Grupos Sociais Acerca Dos Fatores De Risco Para Bronquiolite.

Autores: ANA CAROLINA SALES JREIGE (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS- UNICEPLAC), LOUISE HABKA CARIELLO (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS- UNICEPLAC), ANA BEATRIZ FREIRE RIBEIRO (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS- UNICEPLAC), LUDMILLA SIMEÃO FERREIRA DOS SANTOS (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS- UNICEPLAC), LAÉRCIO GOMES SOARES FILHO (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS- UNICEPLAC), MARCO ANTÔNIO ALVES DA CUNHA (PROFESSOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS- UNICEPLAC)

Resumo: Introdução: A bronquiolite é uma inflamação da mucosa dos brônquios, geralmente de etiologia viral, comumente causada pelo vírus sincicial respiratório. Apresenta edema e necrose epitelial da mucosa, podendo ter broncoespasmo e acometendo principalmente lactentes de até 1 ano. Objetivo: Comparar o entendimento dos fatores de risco da bronquiolite entre estudantes e profissionais da área da saúde. Métodos: Foi realizado um questionário com 79 pessoas durante o mês de abril de 2019, avaliando o conhecimento dessa população em relação aos fatores de risco sobre bronquiolite por meio de um questionário contendo sete perguntas. Resultados: Dos 79 que responderam ao questionário, 57 eram estudantes e 22 eram profissionais da área da saúde. A resposta da pergunta “Existe relação entre bronquiolite e posterior surgimento de asma?” foi a única a apresentar diferença estatística ($p < 0,005$). A maioria de ambos os grupos marcaram a assertiva incorreta, sendo que no grupo de profissionais percebeu-se menor taxa de erro (54,5 X 80,3). Das outras respostas, a maioria dos grupos acertou o questionamento, sem diferença estatística relevante. Conclusão: Apesar da bronquiolite ser uma doença com pouco difundida entre a população geral, o questionário aplicado aos grupos da área da saúde apresentou grande taxa de assertividade, com pequena diferença entre estudantes e profissionais já formados. A aprendizagem eficaz possibilita que os casos de bronquiolite sejam identificados mais rapidamente e tratados corretamente, evitando complicações.