



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Dos Óbitos Em Crianças Menores De 5 Anos Decorrentes De Bronquiolite Aguda No Ano De 2017 No Brasil

Autores: NALYNE CARVALHO DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), KELLYN MARIANE SOUZA SALES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), CAMILLA KARINNE GUIMARÃES ROSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), MAYLLA FONTES SANDES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), ADRIANA BARBOSA DE LIMA FONSECA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE)

Resumo: INTRODUÇÃO: A Bronquiolite viral aguda consiste em uma afecção viral, ocasionada principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), que acomete lactentes com idade inferior a dois anos, sendo o pico de incidência abaixo de seis meses de vida. OBJETIVO: Analisar o perfil dos óbitos por bronquiolite aguda em crianças menores de 5 anos de idade nos anos de 2017 nas regiões brasileiras levando em consideração variáveis como faixa etária. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo e analítico, de caráter retrospectivo. Os dados foram obtidos do sistema DATASUS referentes a óbitos por bronquiolite aguda no país nos anos de 2017, analisando a prevalência entre as regiões assim como a variável de idade. RESULTADOS: Houve um total de 232 óbitos na soma das 5 regiões brasileiras dentro do período indicado. A região sudeste obteve os maiores valores com 120 óbitos (51,72), seguida da região nordeste com 40 óbitos (17,24), região sul com 35 óbitos (15,08), região norte com 25 óbitos (10,77) e centro-oeste com 12 óbitos (5,17). Desses 232 óbitos, 207 (89,22) deles ocorreram em crianças com 28 a 364 dias, 18 (7,75) em crianças de 1 a 4 anos e apenas 7 óbitos (3,01) em crianças na faixa etária de 7 a 27 dias. CONCLUSÕES: De acordo com os dados, a maior prevalência de óbitos por bronquiolite aguda no ano de 2017 foi em crianças de 28 a 364 dias residentes na região sudeste. Dessa forma, esse grupo necessita de maiores cuidados preventivos, além de diagnóstico e tratamento precoces.