



Trabalhos Científicos

Título: Escabiose: Relato De Caso

Autores: PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DA SILVEIRA (UNIFACIG MANHUAÇU MG), MAYZA DOMICIANO ARAUJO (UNIFACIG MANHUAÇU MG), LETÍCIA NORA HENRI GUITTON (UNIFACIG MANHUAÇU MG), PATRICIA DA MATA HUEBRA (UNIFACIG MANHUAÇU MG), ARTHUR MENDES PORTO PASSOS (UNIFACIG MANHUAÇU MG), SARA HERTEL RIBEIRO D'AVILA (UNIFACIG MANHUAÇU MG), MYLENA VENTURY CONTERINI (UNIFACIG MANHUAÇU MG), DARLEI MONTES CUNHA (UNIFACIG MANHUAÇU MG), GABRIELA HERINGER ALMEIDA (UNIFACIG MANHUAÇU MG), MATHEUS TERRA DE MARTIN GALITO (UNIFACIG MANHUAÇU MG), LETÍCIA ARAÚJO MACHADO (UNIFACIG MANHUAÇU MG), ISABELLE VIEIRA PENA (UNIFACIG MANHUAÇU MG), LARISSA NOGUEIRA PAULINI CRESCENCIO (UNIFACIG MANHUAÇU MG), LUSITÂNIA DE PAULA RAMOS OLIVEIRA (UNIVIX-VITORIA ES), GLÁDIMA REJANE RAMOS ARAÚJO DA SILVEIRA (UNIFACIG MANHUAÇU MG), ROBSON DA SILVEIRA (UNIFACIG MANHUAÇU MG), MARIANA SILOTTI CABELINO SEYFARTH (UNIFACIG MANHUAÇU MG)

Resumo: Introdução Escabiose ou sarna é uma doença ectoparasitária provocada pelo *Sarcoptes scabiei*. Afeta principalmente as crianças pré-escolares e adolescentes de países em desenvolvimento, no Brasil a prevalência é de cerca de 10. Embora afete muitas pessoas e possa se apresentar na sua forma comum e grave, é considerada uma doença negligenciada, devido à ínfima existência de programas para controle dessa patologia. Descrição do relato S.R.M., 3 anos de idade, sexo masculino. Mãe procurou atendimento médico pelo aparecimento de erupções cutâneas com prurido na região axilar, fez tratamento para alergia, mas sem sucesso. As erupções se espalharam para tronco, membros superiores, principalmente cotovelos, membros inferiores, região glútea e face, com suspeita inicial de varicela, mas posteriormente confirmado escabiose. Discussão Diagnosticar adequadamente a escabiose, com base na patogenia clínica e na raspagem cutânea, além de saber diferenciá-la de outras dermatoses pruriginosas, mostra-se imprescindível na pediatria. O prurido geralmente intenso e de agravamento noturno, associado a lesões cutâneas com localização acentuada nos genitais e nas polpas interdigitais das mãos, são os achados clínicos típicos de tal patologia. A efetividade do tratamento depende do diagnóstico correto, somado à boa adesão das medidas terapêuticas, por parte tanto dos pacientes quanto dos contatos próximos a eles, mesmo que não aparentem estar infectados. **CONCLUSÃO** Tendo em vista que a escabiose persiste como uma dermatose frequente e considerando que a negligência quanto à doença condiciona o grau de prevalência, o tratamento persiste como um desafio social. Por conseguinte, o diagnóstico precoce e o a implementação correta do tratamento são fatores cruciais para a evolução positiva do quadro.