



Trabalhos Científicos

Título: Pâncreas Ectópico Em Criança.

Autores: CARLA KARINY CANTUÁRIA BRAGA PONTES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC), ALANA SPERANDIO PORTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC), MARIANA DE FREITAS FRATARI MAJADAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC), ANITA SPERANDIO PORTO (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA - SBP), ALICE SPERANDIO PORTO (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB), FÁBIO JÚNIOR DE REZENDE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC), ALINE SPERANDIO PORTO REZENDE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR), JULIANA ROQUE DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC)

Resumo: INTRODUÇÃO: Pâncreas Ectópico ou Heterotópico é definido como a presença de tecido pancreático em posição topográfica anômala e sem qualquer tipo de conexão com o pâncreas normal (seja anatômica, vascular ou neural). Relatamos um caso de uma paciente pediátrica. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 3 anos e 8 meses, com quadro clínico de constipação intestinal crônica, dor e distensão abdominal. Realizou ultrassonografia abdominal, que evidenciou uma massa anormal no intestino. Uma amostra foi retirada e encaminhada para análise histopatológica. Macroscopicamente, o material consistia em uma formação cística, firme e elástica, medindo 5,5x5,5x4,0cm, pesando 23 gramas, com superfície parda, opaca e com aderências. Aos cortes, apresentava uma cavidade uniloculada, cuja superfície interna era irregular. Microscopicamente, os cortes histológicos eram representativos de intestino delgado. A gordura adjacente continha hiperplasia reacional de padrão folicular, com fibrose, delimitando uma pseudocápsula cística, com parede irregular e erodada. Aderida ao intestino, em submucosa, notou-se nódulo medindo 10x10mm, constituído por ácinos, ductos pancreáticos e Ilhotas de Langerhans. Conclui-se que se tratava de um Pâncreas Ectópico em intestino delgado. DISCUSSÃO: Pâncreas Heterotópico (PH) é relativamente incomum. Sua localização é preferencialmente no estômago, duodeno e jejuno, ocorrendo em menor proporção no íleo, divertículo de Meckel e raramente no esôfago, fígado e vesícula biliar, omento, pulmões, mediastino, trompas uterinas e umbigo. CONCLUSÃO: Há 4 tipos de PH (tipos I a IV), de acordo com os componentes do tecido ectópico comparado ao pâncreas. Nessa classificação, o caso trata-se de uma Heterotopia Completa, por apresentar todos os componentes pancreáticos. O PH pode ser visto em qualquer idade, predominando na 6ª década de vida. Em adultos, a incidência maior é em homens, enquanto em crianças prevalece em meninas. A maioria dos pacientes são assintomáticos e o diagnóstico é realizado por ocasião de exame radiológico, endoscópico ou cirurgia por outras queixas.