

## **Trabalhos Científicos**

Título: Enterocolite Necrosante: Um Relato De Caso

Autores: ISABELLA GATTO PIRES DA SILVA (UFFS), GIANI CIOCCARI (UFFS), CAROLINA BALLESTER LOPES (UFFS), JANAÍNA COSSETIN (UFFS), FERNANDA DE OLIVEIRA (UFFS), CAMILA COSTA SOARES (UFFS), JÉSSICA PASQUALI KASPERAVICIUS (UFFS), BRUNO HIDEMI TOMINAGA (UFFS), NATÁLIA BENDER FUHR (UFFS), IURY DARON (UFFS), HENRIQUE FERNANDO PAULINO DA SILVA (UFFS), VINÍCIUS

VIENCHINSKI RADAELLI (UFFS), MARÍLIA SONDA (UFFS), RAQUEL BUFFON (UFFS),

BRENDA BARBETTA (UFFS), YASMIM MENDES SILVA (UFFS)

Resumo: Introdução: Enterocolite necrosante é definida como doença inflamatória intestinal adquirida que tem como característica a apresentação de uma necrose de coagulação da mucosa intestinal. É considerada uma emergência gastrointestinal dos neonatos. Descrição do caso: JMV, sexo masculino, três meses de idade procurou atendimento em unidade de emergência por distensão abdominal, acompanhada de eliminação de fezes fétidas há dois dias e dificuldades na ingesta de leite materno há uma semana. Paciente prematuro, 33+3 semanas, baixo peso ao nascer com histórico neonatal de meningite, sepse e insuficiência cardíaca congestiva. Apresentava abdome distendido, hipertimpânico, com hepatomegalia. Após realização de exames laboratoriais e de imagem, constatou-se estenose intestinal, sugerindo um quadro relativo à enterocolite necrosante. Discussão: A patologia é conhecida como a "doença dos sobreviventes", por sua frequência aumentada em neonatos e lactentes que passaram por inúmeras intercorrências no primeiro mês de vida, sendo a prematuridade um fator de risco importante. Além disso, outros fatores de risco conhecidos são asfixia, distúrbios respiratório, persistência do canal arterial, entre outros. Íleo terminal e colon ascendente são as áreas mais comumente afetadas. Conclusão: O caso relatado é um excelente exemplo de como os fatores de risco, em especial a prematuridade, podem estar relacionados ao desfecho. É de extrema importância o reconhecimento precoce dos sintomas, para manejo eficiente e prognóstico favorável.