



Trabalhos Científicos

Título: Prurido Generalizado Como Sintoma Inicial De Linfoma De Hodgkin: Relato De Caso

Autores: ANGELA DA FONSECA BORGES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO),
MARIANNE QUINTAS RABELLO MORAES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO)

Resumo: O linfoma de Hodgkin é uma doença que pode surgir em qualquer parte do corpo e pode ocorrer em qualquer faixa etária, sendo mais comum em adolescentes e adultos jovens (15-29 anos). Seu sintoma principal é adenopatia não dolorosa, podendo ter dispneia, além de sintomas constitucionais. O prurido intenso refratário ao tratamento habitual não é um sintoma comum e tem pouco significado clínico, mas pode ocorrer geralmente logo no início da doença e pode auxiliar diante do contexto clínico. J.C, 15 anos, iniciou prurido generalizado, evoluindo com lesões crostosas em membros e tronco. Após 2 semanas, evoluiu com adenomegalia cervical não dolorosa, associada posteriormente a linfonomegalia inguinal contralateral importante, com 40mm em seu maior comprimento. Paciente fez uso, por conta própria, de corticoterapia oral em dose terapêutica, o que diminuiu a linfonomegalia e a intensidade do prurido. Pelo quadro clínico inicial, sem alterações iniciais no hemograma, foram investigadas inicialmente infecções fúngicas sistêmicas, além de causas infecciosas como doença da arranhadura do gato e infecção por Epstein-Barr vírus, por exemplo. Todas as hipóteses foram descartadas, sendo indicada a biópsia de linfonodo que indicou linfoma de Hodgkin. O prurido generalizado não costuma ser o sintoma inicial no diagnóstico de linfoma de Hodgkin, porém é um sintoma importante no quadro clínico descrito. A associação com adenopatia generalizada não dolorosa resultou em investigação para principais causas infecciosas, principalmente virais e fúngicas, o que resultou em um confundimento no caso clínico e levou ao diagnóstico mais tardio. O uso da corticoterapia oral pode ter mascarado inicialmente alterações no hemograma, o que leva à dificuldade da investigação diagnóstica. O objetivo deste trabalho foi destacar a importância da detecção precoce deste tipo de câncer, mesmo que os sintomas iniciais não sejam clássicos. Faz-se necessário encontrar o tumor em uma fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de tratamento.