



Trabalhos Científicos

Título: Cistite Xantogranulomatosa Simulando Tumor De Úraco Em Criança Portadora De Bexiga Neurogênica: Relato De Caso.

Autores: LUCILE BESERRA SENA (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), LIANA MOREIRA FREITAS (ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA), JOÃO LINO DOS SANTOS FILHO (HOSPITAL GERAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA), EDINE COELHO PIMENTEL (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO), LIA CORDEIRO BASTOS AGUIAR (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), KATHIA LILIANE DA CUNHA RIBEIRO ZUNTINE (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), FLÁVIA DIAS SILVEIRA (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), MÁRCIA DIAS SILVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ), ADRIANA BARROS LEAL DANTAS (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), DANIELLE CARVALHO PEDROSA (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), KATIA VIRGÍNIA ROCHA (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), FRANCISCO AFRANIO PEREIRA NETO (HOSPITAL GERAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA), ISABELA LOBÃO DA ROCHA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO), NAIANE PERRUCI RIBEIRO (HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN), VANESSA ALMEIDA CAMPOS (ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA)

Resumo: Introdução: A bexiga neurogênica é uma condição na qual há a hipercontratibilidade detrusora, com diminuição da complacência vesical e acúmulo de resíduo miccional. Essa patologia pode ser secundária à disrafismo, como mielomeningocele. As infecções de trato urinário são a principal complicação da bexiga neurogênica não corretamente tratada. Relato de caso: Criança, 5 anos, com diagnóstico neonatal de mielomeningocele, corrigida aos 2 dias de vida, evoluindo com bexiga neurogênica e hidrocefalia não tratadas. Deu entrada no HIAS com quadro de febre, vômitos e dor abdominal. Nos exames da admissão, verificada infecção de trato urinário. Ao exame físico, apresentava massa palpável, endurecida e dolorosa, em região de hipogástrio. Realizado US que mostrou lesão expansiva sólida em topografia supra-vesical. Realizada TC que mostrou formação expansiva arredondada heterogênea, sólido- cística no polo superior da bexiga medindo 6,3x5,5x5 cm com invasão da parede pélvica anterior, sugerindo processo neoplásico. Diante das alterações das imagens, foi aventada hipótese diagnóstica de tumor de útero ou sarcoma. Realizada biópsia de lesão supra vesical, cujo laudo revelou processo inflamatório crônico xantogranulomatoso (ausência de neoplasia). Discussão: Existem cerca de 30 relatos na literatura sobre cistite xantogranulomatosa. Consiste em um processo inflamatório crônico, benigno, cuja causa ainda é incerta. Há descrição de casos relacionados à persistência do útero, infecções crônicas, tumor maligno na bexiga e distúrbios imunológico. O tratamento conservador não se mostra eficaz, sendo necessária ressecção cirúrgica. Conclusão: O tratamento da bexiga neurogênica secundária à mielomeningocele deve ser instituído de forma precoce a fim de evitar infecções urinárias recorrentes. Processos infecciosos recorrentes na bexiga podem predispor à cistite xantogranulomatosa, cujo diagnóstico se faz pelo estudo histopatológico da lesão.