



## Trabalhos Científicos

**Título:** Cisto Mesentérico Em Lactente : Relato De Caso

**Autores:** GÉSSICA PINHEIRO VIEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), IVO BRADLEY MOURA FERREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), LUCIANA MENEZES AGOSTINHO (ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA), SILVANA MARIA DE SOUSA ALVES GOMES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA), DÉBORA AUGUSTA DE SOUSA ALVES GOMES (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTA), LUZIANA MARA FROTA SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), SAMUEL SAMPAIO ALCÂNTARA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), VANESSA ROCHA NEVES CARNEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), MICAELLE ESLOANE SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), LUAN HENRIQUE DE CASTRO PEREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), FRANCISCO DE ASSIS COSTA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), CARLOS ÁLEFE SOUSA NASCIMENTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), PRESLEY XAVIER DE SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), REBECCA QUEIROZ DE CASTRO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTA), GUSTAVO DE MEDEIROS CARVALHO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTA), ALLAN DIEGO DA COSTA LOPES (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTA), RENATHA NARLA MARTINS DE SOUSA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTA), OLAVO JORGE DE NORÕES RAMOS (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTA), MARIA LUISA COELHO MIRANDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTA), IANNA DÉBORA RÊGO GUEDES ALCOFORADO (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTA)

**Resumo:** Introdução: Cistos mesentéricos são lesões raras e geralmente benignas, com incidência próxima a 1/20.000 em crianças. Ocorrem mais frequentemente no sexo masculino (62,5) e a maior parte dos pacientes têm menos de 10 anos, sendo 75 inferior a 5 anos. Relato do Caso: Masculino, 1 mês e 16 dias, apresentando há 9 dias quadro de vômitos persistentes após a amamentação, com baixo ganho ponderal desde o nascimento. Ao exame físico: Abdome pouco distendido, doloroso à palpação em epigástrico e presença de massa em região epigástrica. À gasometria arterial: alcalose respiratória hiperclorêmica. Ultrassonografia de abdome : imagem cística anecóica de contornos regulares ocupando a região epigástrica e mesogástrica. Tomografia computadorizada de abdome e pelve : volumosa formação expansiva cística, com conteúdo homogêneo, paredes finas, bem delimitada, sem realce pelo meio de contraste, com epicentro no mesogástrio, flanco direito, medindo 6,2 x 8,9 x 5,5 cm rechaçando as estruturas adjacentes, sugestivo de Cisto Mesentérico. Foi realizado laparoscópica de urgência, observando-se a presença de lesão cística em antro gástrico, com volume de aproximadamente 165ml, sendo realizada anastomose gastroduodenal. Discussão: Os cistos mesentéricos geralmente são assintomáticos, mas podem apresentar-se com quadro de dor abdominal aguda ou crônica, obstrução intestinal, náuseas e vômitos ou com abdome agudo e choque devido à ruptura, infecção ou torção. Exames de imagem podem ajudar no diagnóstico e no planejamento do tratamento. Conclusão: Cistos mesentéricos são lesões intra-abdominais raras em crianças. O tratamento desses cistos consiste basicamente na sua retirada ou descapsulação, realizada preferencialmente por via laparoscópica.