



Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso - Pericondrite Por Piercing

Autores: LAURA CELLA MACHADO (UNISINOS), BIANCA LARRUSCAIM BIASUZ (UNISINOS), MARIA CRISTINA DEMARI (UNISINOS), CECÍLIA ROTAVA BURATTI (UNISINOS), MAINE SERENA PASA (UNISINOS), JOÃO AUGUSTO KOPS SIMON (UNISINOS), ISADORA FIORIN KUDIESS (UNISINOS), ISABELA MALMACEADA DE MORAES (UNISINOS), EDUARDA OLIVEIRA TYSKA (UNISINOS), ALICE MANGANELI DA SILVA (UNISINOS)

Resumo: A pericondrite corresponde a um processo inflamatório/infeccioso que _x000D_ acomete a orelha externa (pavilhão auricular) que geralmente é secundária a traumas (piercing, contusão ou queimaduras). Classicamente, apresenta-se com hiperemia, edema e dor em pavilhão auricular poupando o lóbulo da orelha. "Paciente masculino, 14 anos, previamente hígido, busca atendimento médico por edema, dor local e eritemas progressivos em pericôndrio do pavilhão auricular esquerdo após colocar piercing há 14 dias. Na emergência, foi observada celulite com lesão supurada concomitante. Inicialmente, internado para antibioticoterapia sistêmica com oxacilina e realização de drenagem cirúrgica. Sem resposta clínica após 48 horas de tratamento com paciente referindo muita dor e mantendo importantes sinais flogísticos locais, optado por nova drenagem cirúrgica, coletando material para cultura e trocado esquema antibiótico para vancomicina e cefepime, evoluindo com ótima resposta terapêutica após 48 horas. Resultado da cultura evidenciou Pseudomonas aeruginosa multissensível, sendo passado para ciprofloxacinha oral e liberado para o domicílio com seguimento ambulatorial. "" Nos casos de pericondrite associado a piercing inicialmente parece ocorrer uma reação de hipersensibilidade conferida ao níquel. Desta forma, a ausência de suprimento sanguíneo arterial exuberante no tecido cartilaginoso contribui para a _x000D_ perpetuação do inflamatório, tornando o meio mais suscetível ao desenvolvimento de infecção. A bactéria mais comumente isolado na pericondrite supurativa é a _x000D_ Pseudomonas aeruginosa. A complicação mais frequente, em casos de tratamentos _x000D_ atraso no diagnóstico é a deformidade do pavilhão auricular (orelha em "couve-flor"). O diagnóstico é clínico e o tratamento envolve antibióticos anti-pseudomonas, anti _x000D_ inflamatórios/analgésicos e em alguns casos drenagem cirúrgica com envio de material para cultura/antibiograma. No presente caso, observou-se que após ajuste de terapêutica antimicrobiana e nova drenagem, houve um progresso satisfatório do _x000D_ paciente. _x000D_ _x000D_ A colocação de piercings pode estar associada a inúmeras complicações principalmente em locais de baixo suprimento vascular. A cobertura para _x000D_ gram negativo é chave do tratamento de pericondrite e a drenagem cirúrgica deve ser considerada sempre na presença de abscesso com coleta de material. O diagnóstico precoce e a instituição de tratamento efetivo são imprescindíveis para minimizar as deformidades estéticas.