

Trabalhos Científicos

Título: Síndrome De Rapunzel: Um Diferencial De Abdome Agudo

Autores: PEDRO LEMGRUBER XAVIER MATTOSO PAVIE (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DOUTOR ANTÔNIO LISBOA (HMIB)), BEATRIZ DE ARAÚJO NUNES GOMES (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DOUTOR ANTÔNIO LISBOA (HMIB)), GUSTAVO MENDES ALCOFORADO (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DOUTOR ANTÔNIO LISBOA (HMIB)), SARAH REIS VILELA (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DOUTOR ANTÔNIO LISBOA (HMIB)), ANA BEATRIZ NERI ROLLEMBERG (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DOUTOR ANTÔNIO LISBOA (HMIB))

Resumo: Os bezoares resultam do acúmulo de material estranho não digerível no trato digestivo. Quando formados por cabelos, são conhecidos como tricobezoares. A Síndrome de Rapunzel (SR) é um evento raro que acontece quando o tricobezoar se estende após o piloro, nas porções iniciais do intestino delgado, podendo chegar até o ceco. "Adolescente do sexo feminino, 11 anos, foi admitida em pronto atendimento de hospital pediátrico de referência com queixa de dor abdominal difusa e contínua há 3 dias, associada a vômitos. Nega febre ou alterações em ritmo evacuatório. A mãe relata o hábito frequente da paciente em levar cabelos e objetos à boca, principalmente em momentos de maior ansiedade. Ao exame físico, apresentava posição antálgica, dor à palpação de hipocôndrio e flanco esquerdos, dor à descompressão brusca, e toque retal normal. A tomografia de abdome com contraste visualizou aparente intussuscepção envolvendo o cólon transversal e estômago, com dilatação à montante do cólon ascendente e ceco. Submetida à laparotomia exploradora, observando-se moderada quantidade de secreção gástrica e perfuração de cerca de 2.5 cm de diâmetro em parede anterior do estômago, bloqueada por omento. Foi encontrado tricobezoar volumoso com alguns pedaços de material plástico que se estendia do estômago até jejuno proximal, sendo realizada retirada manual do mesmo. Evoluiu com melhora dos sintomas após procedimento." "Os tricobezoares resultam do acúmulo de massa composta de fios de cabelos no trato digestivo, associado ou não a motilidade gástrica prejudicada, porém muitas vezes associados à tricotilomania (transtorno psiquiátrico com desejo incontrolável de retirar fios de cabelo do corpo). A maioria dos pacientes com bezoares tem sintomas leves como náuseas, vômitos, saciedade precoce, dor abdominal. A SR é um evento raro onde o tricobezoar se estende até porções iniciais do intestino delgado. Faz alusão à personagem literária dos Irmãos Grimm, que possuía longos fios de cabelo. Complicações graves incluem úlceras gástricas, perfuração, pancreatite aguda (simulando um abdome agudo obstrutivo/perfurativo) e até morte. O caso em questão relata uma SR que evoluiu com perfuração gástrica e prontamente foi conduzida pela equipe pediátrica e cirúrgica apresentando um desfecho favorável ao paciente._x000D_