

Trabalhos Científicos

Título: Anafilaxia Ao Ovo: Diagnóstico Imediato Para Manejo Apropriado

Autores: CELSO TAQUES SALDANHA (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), CAROLINE DARSA BOIANOVSKY (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), DANIELA DE SOUSA E SILVA ALEIXO (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), EUNICE LOPES SOARES (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), LETÍCIA TEIXEIRA MARTINS (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), LUCAS RAMOS KELLER (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), LUISA RASIA MONTENEGRO (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), MARIA ALICE MONTALVÃO FERRAZ (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), MARIA EDUARDA DE ALMEIDA BORGES (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), RAFAEL PIMENTEL SALDANHA (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA), VIVIAN MIRANDA SAGGIORO (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA)

Resumo: Tendo como característica marcante e dramática da anafilaxia a possibilidade de levar rapidamente a óbito uma pessoa previamente saudável, caracterizar com precisão o diagnóstico de anafilaxia e seu manejo apropriado em serviço de emergência pediátrica, assume sua relevância clínica para desfecho favorável. "Mãe em atendimento médico refere que sua filha, idade aproximada de 7 meses de idade, nascida de parto cesárea, termo, AIG e sob aleitamento materno exclusivo por 6 meses, teve um episódio de lesões urticariformes generalizadas, associadas a vômitos e que surgiram imediatamente após o consumo de ovo cozido, durante a introdução da alimentação complementar em seu cardápio. Diante das sintomatologias apresentadas, lactente recebeu diagnóstico imediato de reação anafilática ao ovo por provável mecanismo IgE mediada e iniciado tratamento apropriado com Adrenalina intramuscular, obtendo reversão clínica. Ainda no atendimento, genitora foi orientada a suspender o consumo do ovo na dieta da criança, ficar atenta sobre manifestações clínicas compatíveis com alergia, similares à anafilaxia, além de adquirir adrenalina autoinjetable para possíveis reações futuras de anafilaxia bem como procurar ambulatório médico especializado de cuidados de enfermidades alérgicas." "Sabe-se que a anafilaxia é uma condição clínica de início rápido (minutos a várias horas) e que em quase 90% dos casos cursa com envolvimento principalmente da pele, tecido mucoso ou ambos, além de outras manifestações clínicas. Assim, diante do início agudo da lactente com envolvimento da pele (urticária generalizada) e vômitos e mediante uma história clínica sucinta, estabeleceu-se o diagnóstico imediato de anafilaxia de provável etiologia alérgica por IgE mediada às proteínas do ovo. "O manejo seguro e rápido com tratamento intramuscular de adrenalina foram exequíveis para a reversão imediata da anafilaxia ao ovo, condição clínica potencialmente fatal.