Trabalhos Científicos

Título: Recém-Nascido Com Macrocefalia: Emergência Pediátrica?

Autores: CELSO TAQUES SALDANHA (UNICEUB), CAROLINE DARSA BOIANOVSKY (UNICEUB), DANIELA DE SOUSA E SILVA ALEIXO (UNICEUB), EUNICE LOPES SOARES (UNICEUB), LETÍCIA TEIXEIRA MARTINS (UNICEUB), LUCAS RAMOS KELLER (UNICEUB), LUISA RASIA MONTENEGRO (UNICEUB), MARIA ALICE MONTALVÃO FERRAZ (UNICEUB), MARIA EDUARDA DE ALMEIDA BORGES (UNICEUB), RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA (UNICEUB), RAFAEL PIMENTEL SALDANHA (UNICEUB), VIVIAN MIRANDA SAGGIORO (UNICEUB)

Resumo: Conforme o escore Z da caderneta de saúde da criança, o perímetro cefálico (PC) acima de +2 indica um aumento excessivo do conteúdo intracraniano que pode ser causado por hidrocefalia, hematoma subdural, coleção subdural, aumento do parênquima cerebral de origem metabólica, genética ou ainda macrocefalia familiar. Assim, uma medida de PC acima de dois desvios padrões, deve-se pensar em macrocefalia e adotar as medidas mais adequadas frente uma anamnese e exame físico minuciosos._x000D_ " Neonato, masculino, 26 dias de vida, gestação sem intercorrências, nascido de parto normal, termo AIG, boas condições de vida. Familiares, no entanto, ansiosos, procuram serviço de atendimento infantil em decorrência da percepção do perímetro cefálico estar acima do habitual. No atendimento, é verificado que a criança se encontra sob aleitamento materno exclusivo e com boa sucção, reflexos primitivos presentes. Peso e estatura encontram-se no escore zero e perímetro cefálico entre escore +2 e +3, demonstrando, dessa forma, uma medida antropométrica de circunferência cerebral compatível com macrocefalia. Exame do crânio sem fontanela anterior abaulada e disjunção de suturas além de ausência de dismorfismos e alterações fenotípicas. Irmão com “macrocrania”. Frente à suspeita de macrocefalia constitucional, genitora foi orientada a acompanhar seu filho em serviço de puericultura rotineiramente, após orientações sobre a benignidade da macrocefalia.""A macrocefalia é reconhecida como uma das principais causas de encaminhamento ao serviço de neurologia, sendo definida como aumento do perímetro cefálico acima de dois desvios padrão da média, podendo estar presente ao nascimento ou surgir ao longo dos primeiros anos de vida, sobretudo no primeiro ano. Assume, dessa forma, a necessidade de conhecimentos e condutas por parte do pediatra , buscando detectar anormalidades no desenvolvimento neuropsicomotor, além de sinais neurológicos focais._x000D_ "Embora nem sempre seja uma emergência, é importante agendar uma consulta médica o mais rápido possível para que seja feita uma avaliação adequada e determinar se há necessidade de investigação adicional ou intervenção médica. O médico poderá determinar se a macrocrania é benigna ou se indica a necessidade de investigação adicional._x000D_