Trabalhos Científicos

Título: Perfil Epidemiológico Das Internações Por Linfoma Não-Hodgkin Em Crianças De 1 A 9 Anos De Idade No Estado Do Pará Entre 2020 E 2023.

Autores: VICTORIA DUARTE BARROS DE BRITO (FESAR), DEMETRIUS DE SOUZA E SILVA (FESAR), CAIO VIÑÉ ROCHA (FESAR), LEONARDO MIRANDA DOS SANTOS (FESAR), LETÍCIA LAÍS RIBEIRO DE LIMA (UPE), ANDERSON FELIPE BEZERRA DA SILVA (FMS), VALÉRIA DE FREITAS FERREIRA PAGANI (FESAR), WILLIENE DA SILVA FERREIRA (FESAR)

Resumo: O linfoma não-Hodgkin em crianças é uma forma rara de câncer que afeta o sistema linfático, representando cerca de 7% dos casos pediátricos de câncer. Seu diagnóstico precoce e o tratamento multidisciplinar são fundamentais para melhorar as taxas de sobrevida e qualidade de vida dos pacientes infantis."Traçar o perfil epidemiológico acerca das internações por linfoma não-Hodgkin em crianças de 1 a 9 anos de idade no estado do Pará durante o período de 2020 a 2023."Trata-se de um estudo epidemiológico, quantitativo e observacional, o qual foi realizado mediante a análise de dados secundários obtidos a partir do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). As variáveis utilizadas foram: total de internações, sexo, cor/raça e faixa etária. Os dados foram tabelados no Microsoft Excel 365."Por meio da análise de dados, observou-se que, no período considerado, foram registradas 186 internações por linfoma não-Hodgkin de crianças de 1 a 9 anos de idade no estado do Pará, o que corresponde a 4,21% do total de internações no Brasil. Em relação à faixa etária, as crianças de 5 a 9 anos foram mais acometidas, representando um total de 120 casos (64,52%), seguidas pelas de 1 a 4 anos, com 66 casos (35,48%). Visualizou-se, ainda, maior prevalência de casos no sexo masculino, com 127 casos, o que equivaleu a 68,28% do total de internações pediátricas de crianças entre 1 e 9 anos de idade no estado do Pará. Quanto à cor/raça, os indivíduos pardos foram mais acometidos, com 137 casos (73,66%)."Os dados observados são importantes para a identificação do perfil epidemiológico dos pacientes pediátricos internados por causa do linfoma não-Hodgkin no estado do Pará, o que facilita o estudo da morbidade da doença. Desse modo, constata-se a maior prevalência de internações devido à neoplasia referida em crianças do sexo masculino e com idade entre 5 e 9 anos. Portanto, é primordial o conhecimento acerca das diversas apresentações clínicas da patologia para realizar o diagnóstico precoce e, assim, estabelecer o tratamento necessário.