



## Trabalhos Científicos

**Título:** Urticária, Angioedema Ou Anafilaxia: Como Proceder?

**Autores:** CELSO TAQUES SALDANHA (UNB), RODRIGO DOS SANTOS LIMA (UNB), LUCAS FREIRE CARDOSO (UNB), ANA LAURA SOUZA DE BARROS (UNB), BEATRIZ SALES DE FREITAS (UNB), CAIO RESENDE DA COSTA PAIVA (UNB), CAMILA PEREIRA OLESKOVICZ (UNB), MATEUS RUPERTO MALLOSTO DAS CHAGAS (UNB), MARIA LUIZA MARINHO DE SÁ DE PAULA LIMA (UNB), GABRIEL HAIEK FERNANDES (UNB)

**Resumo:** A anafilaxia é definida como uma reação multissistêmica grave de início agudo e potencialmente fatal, podendo apresentar urticária, angioedema, hipotensão arterial, comprometimento respiratório e gastrointestinal. A ocorrência de dois ou mais destes sintomas imediatamente após a exposição ao alérgeno suspeito alerta para o diagnóstico e tratamento imediato. "Pais em consulta pediátrica referem que seu filho nascido de parto vaginal, termo, AIG, em boas condições de vitalidade, com tempo de aleitamento materno exclusivo de 6 meses, apresentou com 1 ano e 8 meses de vida lesões generalizadas em pele, sendo conduzido à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A afecção dermatológica foi diagnosticada como "alergia da pele", devido ao consumo do leite de vaca e os genitores receberam orientação para suspender o leite de vaca e derivados de sua dieta habitual, além do uso de "antialérgicos". Em atendimento e após anamnese minuciosa, constatou-se que na ocasião supramencionada, paciente teve lesões dermatológicas compatíveis com urticárias, além de associações com náuseas, vômitos e tosses, sendo, portanto, correspondente à anafilaxia. Familiares receberam orientação para permanecerem com exclusão do leite e derivados e adquirirem adrenalina auto-injetável." "Discussão: No caso supracitado, a criança foi atendida em uma UPA sem receber tratamento adequado com adrenalina para anafilaxia, condição clínica potencialmente fatal. Deve ser destacado que a anafilaxia deve ser averiguada em serviços de emergências infantis, notadamente diante de sintomatologias cutâneas, visto que cerca de 90% dos casos cursam com urticárias e angioedemas, além de outros critérios importantes definidos em seu diagnóstico pela World Allergy Organization." Conclusão: Em serviços de emergência pediátrica, a anafilaxia, com seu espectro de manifestações clínicas, é uma enfermidade possível de ser detectada mais frequentemente, utilizando-se critérios mais abrangentes e evitando-se, dessa forma, sua subnotificação, subdiagnóstico e possíveis erros ou retardos na condução e terapêutica adequadas.