Trabalhos Científicos

Título: Perfil Clínico E Epidemiológico De Pacientes Com Sarcoma De Ewing

Autores: MATHEUS AMORIM GRIGORIO (UNICEPLAC), JULIANNA LEÃO SANTOS (UNIEURO), BRENNA FRIDERICHS WHITLEY (UNICEPLAC), MARIA EUGÊNIA PISSINATI GOMES (FAMENE), KARLA PORPINO DE ARAÚJO FERREIRA PINHEIRO (FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU.), ISABELA PFEIFER DE PARIS (UNIATENAS), RAYSSA BLENDA MARTINS (UNICEPLAC), TÁBATA DE OLIVEIRA SILVA (UNICEPLAC), FELIPE QUALHATO ARAÚJO (UNICEPLAC), NAYARA DE SOUZA PIMENTEL FELIX CARDOSO (UNICEPLAC), RACHEL GOMES DE ANDRADE MENDONÇA (UNICEPLAC), VICTORIA CARNEIRO MACIEL (UNICEPLAC), LUCCA PIACESI MUNIZ DE MELO (UNICEPLAC), BRUNO RENAN DE CARVALHO LOPES (FACID- FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL)

Resumo: O aspecto principal em que se faz necessário um estudo sobre o câncer é entender que vidas são transformadas por uma patologia que é de difícil diagnóstico, tratamento e compreensão. É importante compreender toda uma conjuntura de fatores e sinais, ao compilar os principais pontos característicos, eles levam à suspeita de um Sarcoma de Ewing, esse que tem como características ser uma neoplasia maligna agressiva originária dos ossos, compreendendo o segundo tumor primário mais comum entre crianças e adolescentes. "Compreender o sarcoma de Ewing em toda sua clínica e conceitos."Trata-se de uma revisão sistêmática, utilizando o protocolo PRISMA. Atendendo aos critérios de inclusão que foram artigos dos anos 2017 a 2023, na língua portuguesa e inglesa. Como estratégias para melhor avaliação dos textos, como descritores em saúde (DeCS) foram utilizados: ´Sarcoma de Ewing´ e ´Câncer´"Depreende-se que o Sarcoma de Ewing ósseo é uma neoplasia agressiva, afetando de modo habitual os indivíduos na segunda década de sua vida. Nota-se, também, o surgimento de lesão lícita com reação periosteal típica de lesão agressiva em radiografia. Ademais, o estudo imunoistoquímico é necessário para diferenciar e classificar os tipos de sarcomas da família Ewing. Com base na análise retrospectiva de estudos prospectivos da Cooperative Weichel Sarkom Studiengruppe(CWS), realizada com 60 pacientes, no período de 1997 a 2015, observou-se a prevalência do sarcoma de Ewing em homens, havendo a proporção de 4 homens para 1 mulher. A idade mais atingida por esse sarcoma apresenta em média 14,5 anos de idade. Ademais, a região intra abdominal e retroperitoneais são acometidas em cerca de 93% dos casos, com destaque para região torácica, paratesticular e glândula parótida. Em 67% dos casos tiveram tumores maiores de 10 cm e 88% tiveram tumores disseminados localmente, desta forma na maioria dos casos, o sarcoma foi caracterizado por tumores grandes e disseminados. Desse modo, o caso mostra a importância de investigar patologias que ainda não foram bem elucidadas, visto que doenças raras não fazem parte do cotidiano médico, logo seu diagnóstico trás a oportunidade de obter tratamentos mais especializados. "Desse modo, é importante de investigar patologias que ainda não foram bem elucidadas, visto que doenças raras não fazem parte do cotidiano médico, logo seu diagnóstico trás a oportunidade de obter tratamentos mais especializados.