



Trabalhos Científicos

Título: Artrite Séptica Com Provável Evolução Com Espondilolistese Em Lactente

Autores: LAURA ARAÚJO SIQUEIRA (UFCA), AMANDA DE BRITO ARRAES (UFCA), HIARLLY CAUÊ DE CARVALHO CORTEZ (UFCA), LUANA GALVÃO MATIAS (UFCA), GABRIELLE ALINE ÂNGELO ARAÚJO (UFCA), ITALO JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA (UFCA), DAVI ALVES FERREIRA (UFCA), GEOVANNA CARVALHO DE FREITAS SOARES (UFCA)

Resumo: A artrite séptica é uma inflamação articular secundária a uma etiologia infecciosa causada por uma variedade de microorganismos. Costuma afetar uma única articulação, mas em 15% dos casos pode envolver mais de uma. É uma emergência ortopédica que pode causar danos articulares graves e é mais comum em crianças do sexo masculino. Nos países desenvolvidos, ocorrem de 2-6 casos por 100.000 crianças/ano."B. E. M. S., 3 meses, Peso: 5.050 kg, Altura: 58 Cm. Encaminhado do Hospital de Catarina/CE, no dia 31 de maio de 2023 deu entrada na UTI pediátrica do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, Barbalha/CE, em estado grave. Ao exame físico: EGB, corado, ativo e reativo, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, fáceis atípicas. Neuro: FANT, PIFR, sem sinais de irritação meníngea. Infecção generalizada grave com endocardite e artrite séptica de quadril, iniciada Oxacilina, mas trocada para Vancomicina 60mg/kg no dia seguinte. Entubado e avaliado, ao exame físico: redução de amplitude de movimento, MMSS com leve rotação interna, dedos fletidos, mobilidade reduzida sobretudo à direita, MMII com tônus flácido, fosseta sacral sem visualização de orifício, manchas mongólicas em dorso e MMSS, protuberância endurecida palpável em região dorsal e indolor à palpação. Diagnosticado também com espondilolistese, por lesão edematosas na coluna estudada por tomografia: desvio importante das colunas dorsal e lombar. No momento do internamento foi levantada a suspeita de maus tratos com envio de relatório para o conselho tutelar de Catarina, com relato conflitante da mãe em relação à causa da lesão. A criança permaneceu internada mesmo após superada a infecção para encaminhamento à cirurgia de coluna em Fortaleza, por falta de recursos em Barbalha. Dada a raridade e gravidade da lesão não havia no serviço ou em serviço próximo experiência em caso semelhante para auxílio neste. Especialistas consultados não recomendaram a cirurgia pela história clínica e idade do paciente e informaram que a lesão era mais compatível com infecção pr279;via do que trauma. Paciente evoluiu com estabilidade clínica e hemodinâmica. Alta mediante prévio aviso ao conselho tutelar, e encaminhado pedido de direcionamento hospital Sarah Kubitschek /DF."""O diagnóstico da artrite séptica e tratamento precoces são cruciais para preservar a função articular. Os traumas sem origem específica são comuns nos casos de artrite séptica (20%) e é possível que os relatos dos responsáveis sejam subestimados. A espondilolistese, ainda, pode ter origens diversas, sendo uma condição rara que atinge cerca de 1% das crianças menores que 3 anos.