



**DERMAPED**  
4º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE  
DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA  
PORTO ALEGRE - RS | 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023

**29 DE JUNHO  
A 01 DE JULHO  
DE 2023**

Centro de Eventos do BarraShoppingSul  
Av. Diário de Notícias, 300, Cristal, Porto Alegre - RS



## Trabalhos Científicos

**Título:** Úlcera De Decúbito Tratada Com Laser De Baixa Intensidade + Terpolímero De Acrilato

**Autores:** JANAINA SOARES VIEIRA (HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS/ GOIÂNIA-GO )

**Resumo:** O LASER DE BAIXA INTENSIDADE TEM SE MOSTRADO MÉTODO EFICAZ NA BIOMODULAÇÃO, COLABORANDO COM A CICATRIZAÇÃO SEM EFEITOS COLATERAIS INDESEJÁVEIS, QUANDO BEM OPERADO. TRATAMENTOS TÓPICOS EVENTUALMENTE ASSOCIADOS AO LASER DEVEM SER SELECIONADOS COM CRITÉRIO, NÃO DEVENDO HAVER CONFLITO NO MECANISMO DE AÇÃO DE AMBOS. O RELATO DESTES CASOS TEM O OBJETIVO DE APRESENTAR UM TRATAMENTO EXITOSO DE ÚLCERA DE DECÚBITO SACRAL DE LONGA DATA EM PACIENTE INTERNADA EM UTI PEDIÁTRICA, REALIZADO COM 5 SESSÕES DE LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE APLICADAS PELA PEDIATRA, INTERCALADAS COM CAMADA FINA DIÁRIA DE TERPOLÍMERO DE ACRILATO EM CREME. APÓS 5 SESSÕES DE LASERTERAPIA, INTERCALADAS COM CURATIVOS SUBOCLUSIVOS COM CAMADA FINA DE TERPOLÍMERO DE ACRILATO A ÚLCERA DE LONGA DATA TEVE RESOLUÇÃO. O TRATAMENTO DA ÚLCERA DE DECÚBITO REQUER MOBILIZAÇÃO PERIÓDICA DO PACIENTE, CUIDADOS COM HIGIENE LOCAL E COM AS PATOLOGIAS SISTÊMICAS. NO PRESENTE CASO CLÍNICO TAIS AÇÕES ERAM RIGOROSAMENTE ADOTADAS PORÉM, A LESÃO QUE JÁ SE ARRASTAVA POR 3 MESES COM USO DE ÓLEO DE GIRASSOL TEVE SEU PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO VISIVELMENTE ACELERADO APÓS 30 DIAS DA APLICAÇÃO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE ALTERNADO COM TERPOLÍMERO DE ACRILATO.