



DERMAPED
4º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA
PORTO ALEGRE - RS | 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023

**29 DE JUNHO
A 01 DE JULHO
DE 2023**

Centro de Eventos do BarraShoppingSul
Av. Diário de Notícias, 300, Cristal, Porto Alegre - RS



Trabalhos Científicos

Título: Exostose Subungueal: Um Relato De Caso

Autores: KAREN VINCENZI (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE), ANDRÉ POZZOBON CAPELETTI (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE), LILITH SODRÉ DE SOUZA ELLER (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE), RAQUEL KUPSKE (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE), ANA ELISA KISZEWSKI BAÚ (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE)

Resumo: A exostose subungueal é um tumor osteocartilaginoso benigno que ocorre mais comumente no aspecto dorsomedial da ponta do hálux em adolescentes ou adultos jovens. O diagnóstico diferencial inclui, para além de tumores malignos, verruga viral, fibroma, granuloma piogénico ou osteocondroma subungueal. O diagnóstico é confirmado por radiografia demonstrando-se o crescimento ósseo anormal. Paciente sexo feminino, 16 anos, procurou atendimento por surgimento de lesão nodular em unha de hálux direito, de evolução de aproximadamente 8 meses, sem história de traumatismo local. Apresentava nódulo na falange distal do hálux direito, subungueal, consistência endurecida, doloroso à palpação. Foi solicitado avaliação radiológica que evidenciou pequena formação óssea, com aproximadamente 0,7x0,2cm, junto ao aspecto dorsal do tufo da falange distal do hálux direito, que confirmou a suspeita clínica de exostose subungueal. Encaminhamos a paciente ao serviço de ortopedia para realização de exérese cirúrgica da lesão. Não se aplica. A exostose subungueal é um tumor osteocartilaginoso benigno que ocorre mais comumente no aspecto dorsomedial da ponta do hálux em adolescentes ou adultos jovens. Em seu estágio inicial, o tumor geralmente se apresenta como um nódulo telangiectásico branco-porcelânico firme com um colarinho de escamas sobrejacente que se estende por baixo da unha distal, causando onicólise avermelhada. Com o tempo, o tumor torna-se hiperqueratótico. A dor é variável e pode estar ausente em alguns pacientes. Radiografias simples podem confirmar o diagnóstico clínico. A patogênese exata da exostose subungueal não é clara, embora trauma, infecção, tumor, anormalidade hereditária ou ativação de um cisto cartilaginoso tenham sido sugeridos como possíveis etiologias da exostose subungueal. A maioria a considera uma metaplasia reativa decorrente de microtraumas, no entanto, não há evidências conclusivas para apoiar uma única patogênese. O tratamento é a excisão cirúrgica. A excisão cirúrgica completa da lesão, incluindo sua capa cartilaginosa, fornece tratamento definitivo. O osso cortical da falange distal é vigorosamente curetado para remover quaisquer células tumorais remanescentes.