



DERMAPED
4º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA
PORTO ALEGRE - RS | 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023

**29 DE JUNHO
A 01 DE JULHO
DE 2023**

Centro de Eventos do BarraShoppingSul
Av. Diário de Notícias, 300, Cristal, Porto Alegre – RS



Trabalhos Científicos

Título: Nevo De Becker – Apresentação Não Habitual Em Menina Com Puberdade Precoce

Autores: WALEWSKA HYCZY SARRAFF (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), ESTHER ALVES DE ARAUJO NUNES (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), SARAH POLIANA ROCHA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), THAIS BRAGA CERQUEIRA (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), BEATRIZ CARVALHO (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), ALUHINE LOPES FATTURI (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), BETINA WERNER (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), PRISCILA VERNIZI ROTH (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), VÂNIA OLIVEIRA DE CARVALHO (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR), RENATA ROBL IMOTO (HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR)

Resumo: O Nevo de Becker (nevo epidérmico piloso) é um hamartoma cutâneo benigno de etiologia desconhecida, de início na adolescência e menos frequente congênito. Caracteriza-se como uma mancha unilateral castanho-acinzentada no tórax ou dorso, bem delimitada, irregular e rodeada por ilhas de pigmentação mosqueada, podendo atingir até 10 a 15 cm. Após 1 a 2 anos, pelos terminais espessos aparecem e pode haver um hamartoma de músculo liso associado. A intensidade da pigmentação pode regredir, mas hiperpigmentação e hipertricose tendem a persistir por toda a vida. Mais frequente em homens e, geralmente, sem outros achados patológicos. Quando está associado com outras anormalidades (hipoplasia mamária e areolar unilateral, acne focal, assimetria de membros ou espinha bífida) é denominado Síndrome do Nevo de Becker. Menina, oito anos, Fototipo de Fitzpatrick 4, há dois anos com 2 manchas hipercrômicas, localizadas em face interna de braço direito e região supra clavicular esquerda. Sem sintomas locais ou sistêmicos. Nega tratamento prévio. Diagnóstico de puberdade precoce rapidamente progressiva. Ao exame presença de mancha hipercrômica, aspecto folicular e com aumento de pilificação de 9,5 x 4,0 cm (lesão 1) e mancha de pigmentação acastanhada uniforme em região supra clavicular esquerda de 3,0 x 2,0 cm (lesão 2). Realizada biópsia de pele de lesão 1 com diagnóstico de Nevo de Becker. O Nevo de Becker apresenta-se como uma mancha hiperpigmentada que tipicamente se fragmenta em máculas menores na sua periferia e pode ter hipertricose associada. Tem predileção pelo tronco lateral superior e geralmente aparece na época da puberdade. Suas características clínicas e sua ocorrência principalmente em indivíduos do sexo masculino sugerem que a estimulação androgênica seja um fator causal. Na histologia, há acantose e alongamento das cristas epidérmicas, associadas ao aumento de pigmento na camada basal e melanófagos na derme superior. Os feixes de músculo lisos podem estar aumentados. A paciente relatada coincidentemente apresentava puberdade precoce que pode estar relacionada a diversos contextos clínicos que incluem obesidade, resistência à insulina e hiperandrogenismo, este último um desencadeante do nevo de Becker. As lesões hiperpigmentadas estão relacionadas a uma multiplicidade de condições clínicas, desde variações normais da cor da pele a síndromes hereditárias e adquiridas e é um dos motivos mais comuns de consulta dermatológica. É importante pensar em nevo de Becker quando surgem no períodos de estímulo hormonal.