



DERMAPED
4º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA
PORTO ALEGRE - RS | 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023

**29 DE JUNHO
A 01 DE JULHO
DE 2023**

Centro de Eventos do BarraShoppingSul
Av. Diário de Notícias, 300, Cristal, Porto Alegre - RS



Trabalhos Científicos

Título: Doença De Riga-Fede – Um Caso Diagnosticado Na Emergência Pediátrica

Autores: PÂMELA CRISTINE VIANA ANTUNES (IPEMED), MICHELLE GOMES DA SILVA (UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA)

Resumo: A doença de Riga-fede é uma condição benigna, rara, onde há traumatismo crônico da língua e/ou mucosa labial pelos dentes, podendo evoluir para uma fibrose local do tecido, com a aparência de úlcera granulomatosa. Pode estar associada a anomalias congênitas e distúrbios neurológicos, incluindo disautonomia familiar (síndrome de Riley-Day), disfunção autonômica congênita, microcefalia, Síndrome de Lesh-Nyhan e síndrome de Tourette. Tem como diagnósticos diferenciais, lesões ulcerativas incluindo carcinoma de células escamosas, candidíase ulcerativa, sífilis primária, tuberculose, sarcoma, e linfomas. Na maioria das vezes a úlcera é assintomática, mas em alguns casos pode causar irritabilidade e dificuldade na sucção de seio materno. Tratamento é estabelecido de acordo com o caso, nos casos mais graves é necessário a extração dos dentes para resolução total da úlcera. G.E.S.F.R.A, sexo masculino, 1 ano e 4 meses compareceu a emergência pediátrica com quadro de febre há 4 dias e tosse, sem outras queixas associadas. Não acompanhava com consultas de puericultura desde o nascimento. Ao exame da cavidade oral apresentava lesão ulcerada extensa em região ventral da língua. Presença de 2 dentes neonatais (região de incisivos inferiores) em arcada dentária inferior. Mãe não sabia informar o início do aparecimento da lesão e estava em uso de nistatina oral. Alimentação própria para idade e seio materno Não apresentava outras alterações no exame físico Realizado exames laboratoriais e sorologias com resultados normais Encaminhada ao serviço de odontologia e orientado cuidados de higiene. Mantido a prescrição de nistatina oral pela presença de lesões em placas brancas em cavidade oral sugestivas de candidíase. Criança retornou 20 dias após o primeiro atendimento, relatando avaliação do dentista do posto de saúde próximo a sua residência que orientou conduta expectante. Ao exame apresentava leve melhora na cicatrização da lesão na língua mãe refere diminuição da frequência das mamadas em seio materno. Após essa consulta, mãe não compareceu mais na emergência para reavaliação, não possibilitando o acompanhamento do caso. A doença de Riga-fede é caracterizada pela presença de úlcera, principalmente na região ventral da língua, causada pelo movimento repetitivo do órgão sobre os dentes. Apesar de ser uma condição benigna, pode evoluir com infecções secundárias locais, e uma inadequada sucção do leite e alimentação, colocando a criança em risco de deficiências nutricionais. Apesar da doença, na maioria das vezes, ser diagnosticada e ter abordagem terapêutica pela odontologia, a criança tem o primeiro atendimento na emergência ou no pediatra assistente, portanto este profissional deve ter conhecimento sobre alterações que ocorrem na cavidade oral, identificando assim lesões patológicas e possíveis síndromes associadas.