



DERMAPED
4º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA
PORTO ALEGRE - RS | 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023

**29 DE JUNHO
A 01 DE JULHO
DE 2023**

Centro de Eventos do BarraShoppingSul
Av. Diário de Notícias, 300, Cristal, Porto Alegre - RS



Trabalhos Científicos

Título: Tinea Nigra: Um Diagnóstico Diferencial Importante Das Lesões Pigmentadas Acrais Na Criança

Autores: SABRINA LUDWIG KLEIN (UFCSPA), LUCAS ABASCAL BULCÃO (UFCSPA), LAURA MOREIRA MEDEIROS (UFCSPA), MARIA JÚLIA PEDROZA (UFCSPA), ANA ELISA KISZEWSKI BAU (UFCSPA E SCMPA)

Resumo: A Tinea nigra é uma micose superficial endêmica de regiões tropicais e pouco frequente em outras latitudes, causada pelo fungo *Hortaea werneckii*. Acomete principalmente crianças e adolescentes. Caracteriza-se pelo aparecimento de máculas acastanhadas de bordas definidas e irregulares, assintomáticas, em regiões palmares ou plantares. Tem como principais diagnósticos diferenciais as lesões pigmentadas acrais, como o melanoma, devendo ser lembrada nesses pacientes. Paciente feminina de 4 anos foi trazida pela mãe com queixa de lesões em mão que surgiram há cerca de 2 anos, com aumento de tamanho e surgimento de lesões satélite. Foram observadas máculas irregulares de tom castanho na região palmar e no quarto dedo da mão esquerda. A dermatoscopia sugeriu o diagnóstico de tinea nigra. Foi proposto o tratamento com miconazol 2% associado a ácido salicílico 3% uma vez ao dia por 1 mês. A tinea nigra tem como principais diagnósticos diferenciais as lesões melanocíticas acrais, incluindo nevos melanocíticos acrais e melanoma. Além da história clínica e dos exames micológicos, a dermatoscopia pode auxiliar no diagnóstico da lesão, que mostra geralmente um lesões espiculadas, formando um padrão reticular-like, que não acompanha os dermatóglifos. O acometimento bilateral ou com lesões satélite sugere autoinoculação do fungo. Apesar do caráter crônico e progressivo das lesões, elas apresentam uma ótima resposta à terapia com imidazólicos e queratolíticos tópicos. A tinea nigra pode ser facilmente confundida na prática clínica com outras lesões pigmentadas como melanoma ou nevos melanocíticos. Sendo assim, o caso ressalta a importância da suspeição da doença como diagnóstico diferencial em crianças com lesões acrais pigmentadas.