

## Trabalhos Científicos

**Título:** Fatores E Comportamentos Associados Aos Adolescentes Usuários De Drogas Lícitas E Ilícitas.

**Autores:** PAULO HENRIQUE ALVES MELO (UFPE), RENATA AMORIM SANTOS (UFPE), MAÍZA DE OLIVEIRA TENÓRIO (UFPE), MARIANA OLIVEIRA TAVARES DOS SANTOS (UFPE), ELISABETE PEREIRA SILVA (UFPE), SUZANA MARIA RAMOS COSTA (UFPE)

**Resumo:** Introdução: O uso de drogas por adolescentes, os fatores associados e as consequências são um problema de saúde pública significativo no Brasil. Objetivo: Determinar a prevalência e os fatores associados ao uso de drogas lícitas e ilícitas por adolescentes. Métodos: Estudo transversal, realizado em ambulatório de adolescentes de um hospital terciário entre setembro/2019 e junho/2021. Resultados: Foram analisados os dados de 223 adolescentes. A prevalência para o uso de álcool foi 28,9%, de cigarro, 3,9% e de drogas ilícitas, 2,5%. Quando analisado se havia associação entre a experimentação de álcool, cigarro e drogas ilícitas, ao sexo, a cor da pele, a naturalidade e a procedência, a estrutura familiar (estado civil dos pais, ter irmão e saúde dos pais), às condições de moradia (ter água encanada, energia elétrica, esgoto e coleta de lixo), à escolaridade do paciente (frequentar a escola, reprovação escolar), renda familiar e vacinação, não houve diferenças estatísticas, refletindo a homogeneidade da amostra. Como fatores associados destacaram-se: para uso de drogas lícitas, idade entre 15 e 19 anos para uso de álcool ( $p = 0,001$ ) e cigarro ( $p = 0,036$ ), para uso de drogas ilícitas, trabalhar ( $p = 0,034$ ) e fumar cigarro ( $p < 0,0001$ ). Os comportamentos associados foram: maior prevalência de coito entre os usuários de álcool ( $p = 0,026$ ), cigarro ( $p = 0,006$ ) e drogas ilícitas ( $p = 0,012$ ), praticar autolesão e ter alucinações, para uso de cigarro e drogas ilícitas, e pensar em fugir de casa ( $p = 0,018$ ) entre os que usavam cigarro. Como fatores de proteção destacaram-se a religião ( $p = 0,007$ ), para o uso de álcool, e atividade física ( $p = 0,009$ ), para o de cigarro. Conclusão: Compreender melhor as vivências relacionadas ao uso de drogas lícitas e ilícitas por adolescentes é fundamental para buscar medidas de prevenção e de tratamento.