



## Trabalhos Científicos

**Título:** Fatores Relacionados Ao Aleitamento Materno De Lactentes Acompanhados Em Um Serviço De Atenção À Saúde Materno Infantil Do Município De São Caetano Do Sul

**Autores:** JULIA MATEO ZYGMUNT (UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL), BRUNA BATISTA LEÃO (UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL), GIOVANNA ORTIGOSSA MORETTI (UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL), ALBERTO BEZERRA PEIXOTO JUNIOR (UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL), VANESSA BUGNI MIOTTO E SILVA (UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL)

**Resumo:** Introdução Apesar dos benefícios relacionados ao aleitamento materno, ainda existem muitas barreiras nesse processo. Reconhecer os fatores associados ao desmame pode gerar melhores índices de amamentação, contribuindo para o melhor desenvolvimento das crianças. Objetivo Avaliar os fatores associados ao aleitamento materno de lactentes acompanhados em um centro de atenção à saúde materno infantil. Métodos Foi aplicado às mães de lactentes de 0 a 12 meses de idade um questionário que avaliou dados sociais e demográficos maternos e do lactente, dados clínicos do lactente na avaliação, orientação e conhecimento sobre aleitamento materno, prática da amamentação e satisfação como o aleitamento materno. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. Resultados Trinta e quatro mães responderam ao questionário entre outubro/2020 e agosto/2021. Não houve associação entre o desmame e a idade materna ( $p=0,59$ ), escolaridade ( $p=0,34$ ), estado civil ( $p>0,99$ ), status empregatício ( $p=0,38$ ), rede de apoio ( $p=0,3$ ), número de filhos ( $p>0,99$ ), sexo do bebê ( $p=0,4$ ), idade gestacional ( $p>0,99$ ), tipo de parto ( $p=0,68$ ), peso para idade ( $p=0,49$ ), comprimento para idade ( $p>0,99$ ), orientação sobre amamentação durante pré-natal ( $p=0,68$ ) ou na maternidade ( $p>0,99$ ), uso de bicos ( $p=0,16$ ) ou dificuldades na amamentação ( $p=0,56$ ). Houve associação entre o desmame e o sentimento de querer desistir de amamentar ( $p=0,03$ ), mesmo quando houve auxílio do profissional da saúde ( $p=0,05$ ). A pandemia de COVID 19 não interferiu no desmame ( $p=0,58$ ). As principais causas para desmame foram retorno ao trabalho e crença de leite fraco ou insuficiente. Conclusão A preocupação com a qualidade e quantidade do leite é um mito que deve ser questionado e discutido com as mães durante as consultas de pré-natal e puericultura. O apoio da equipe de saúde diretamente no processo de amamentação pode ser imprescindível para o seu sucesso, especialmente para as mães que se sentem inseguras e insatisfeitas em relação ao seu processo de amamentação.