



Trabalhos Científicos

Título: Relato Dos Primeiros Casos De Covid-19 Em Pacientes Pediátricos Em Um Hospital Regional Da Grande São Paulo-Sp

Autores: AMANDA LOURENÇO NEVES (HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SP), MARIO EDUARDO FRANCISCO ARGUELLO (HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SP), MAIARA DANIELLE SANTOS SILVA (HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SP), MAYANNE FRAN FRAYHA (HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SP), BEATRIZ GABRIELA SORIA FIGUEROA (HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SP), CAROLINA R. Z. SIMÕES (HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SP), CAROLINA PIOVESANA GARUTTI (HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SP), NATHALIA BEATRIZ PAGLIARINI MARTONI (HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SP), FLAVIA NAVARRO (HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SP), GABRIELA LOPEZ BRAGA (HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SP)

Resumo: Introdução: Devido as vicissitudes do Sars-Cov-2, a heterogeneidade de sintomas da Covid-19 e o retardo na imunização de infantes, é importante manter a Pediatria Geral atualizada sobre as diversas manifestações clínicas, em recortes espaciais e temporais variados. Por isso, apresenta-se relato dos cinco primeiros casos de internação de crianças em unidade hospitalar de referência, a saber Hospital Regional de Cotia-SP. Descrição: A partir da análise dos prontuários, constatou-se a frequência dos seguintes sintomas: (i) febre maior que 38.5°C (100%), (ii) sintomas respiratórios como tosse e coriza (60%), (iii) outros sintomas como sonolência, inapetência, mialgia, dor abdominal, otalgia e astenia (20%). Cerca de 33% dos sintomas são compatíveis com os da gripe. Discussão: Os casos relatados demonstram a diversidade dos quadros clínicos em pacientes pediátricos, confirmam as previsões da literatura e chamam atenção para a dificuldade em um diagnóstico preliminar preciso, por essa razão, desponta a necessidade de ampliação nas testagens e da brevidade na imunização à Covid-19. Conclusão: Veja-se, embora os efeitos da doença sejam, estatisticamente, mais brandos em crianças do que em adultos, os efeitos não são negligenciáveis e podem levar a óbito. Protocolos de testagem devem ser ampliados e a imunização ser efetivada com urgência.