



Trabalhos Científicos

Título: A Importancia No Diagnostico Diferencial Da Encefalite Autoimune Anti-Nmda, Um Relato De Caso

Autores: LAURA MARIA VISCARDI BRIGHENTI (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), ISABELA MARAVALLE RAMOS (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), VANESSA CRISTYNE SAUCEDO BATISTA (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), LARISSA CARVALHO CASER (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), PEDRO ZAMBUSI NAUFEL (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), LAÍS SESTINE DE CARVALHO (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), BARBARA SARAGIOTTO (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), ANNA CAROLINNE CORRÊA DOS SANTOS (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), MAÍRA TERRA CUNHA DE SARNO (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), LOIANE DANTE CORREIA ROCHA (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO)

Resumo: INTRODUÇÃO: A encefalite autoimune anti-NMDA é uma doença rara, embora a mais comum das encefalites autoimunes, por isso, temos como objetivo do trabalho trazer a importância dela como diagnóstico diferencial em quadros de encefalite visto que o diagnóstico e tratamento precoce estão relacionados diretamente a uma boa evolução do quadro. CASO: Paciente feminina de 10 anos, deu entrada em pronto socorro infantil com quadro de cefaleia, náuseas e oscilação de comportamento, com momentos de sonolência excessiva e momentos de agitação e psicose. Previamente hígida e sem história previa de infecção recente, referindo dois episódios de convulsão prévios. Realizados exames laboratoriais e de imagem sem alterações, e solicitado, então avaliação das especialidades. Após avaliação da equipe de neurologia pediátrica foi aventada a hipótese de encefalite autoimune anti-NMDA posteriormente comprovada. Paciente evolui com melhora importante embora não completa do quadro após tratamento com pulsoterapia durante internação, ainda em acompanhamento em ambulatório de neurologia pediátrica. DISCUSSÃO: A encefalite anti-NMDA se caracteriza pela presença de anticorpos anti-NMDA, causando sintomas como convulsão, irritação, sonolência, psicose e comportamento anormal, assim como a paciente em questão. Com etiologia autoimune, esse diagnóstico pode estar relacionado, também, ao surgimento de neoplasias, principalmente de ovário e pulmão, descartados no quadro acima. O diagnóstico é feito com pesquisa de anticorpos IgG anti-NMDA e o restante dos exames costumam ser inespecíficos. O tratamento é realizado com pulsos de corticoide, imunoglobulina ou plasmáfereze e quanto mais precoce for iniciado melhor será o prognóstico. A paciente em questão evoluiu com melhora incompleta e evolutiva após um ciclo de pulso com corticoides. CONCLUSÃO: Por fim sabemos que a disseminação de casos clínicos incomuns dentro do meio médico científico só traz benefícios e, nesse caso não é diferente, podendo incluir a encefalite anti-NMDA como diagnóstico diferencial nos casos de encefalites.