



Trabalhos Científicos

Título: Intussuscepção Intestinal Em Lactentes Hígidos

Autores: NULMA SOUTO JENTSZCH (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS),
LIDIANE BARBOSA ALCÂNTARA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS)

Resumo: INTRODUÇÃO: A intussuscepção intestinal é a emergência abdominal mais comum em pacientes menores de 2 anos. Caracteriza-se pela invaginação de uma parte do intestino para dentro de si. RELATO DE CASO: Lactente, 1 ano, hígido, iniciou com quadro de evacuações com sangue de moderada quantidade associado a episódios de vômito alimentar. Procurou o pronto atendimento devido retorno dos episódios de fezes com sangue sendo encaminhado a internação. Na admissão aventada hipótese de Alergia a proteína do leite de vaca sendo modificado suplementação láctea para leite de soja e iniciado suplementação com sulfato ferroso dose terapêutica devido quadro de anemia. Readmitido no mesmo dia devido piora da prostração e persistência do quadro de vômito. Evoluiu com episódios de melena e piora do quadro clínico com prostração, palidez e taquicardia. Realizados exames que constatarem queda hematócrita importante sendo necessária transfusão de 15 ml/kg e ressuscitação volêmica. Solicitado US abdominal de urgência sendo observado em flanco direito invaginação de alça intestinal que se apresenta em imagem de casca de cebola medindo 2,6 x 1,6 cm. Iniciado Gentamicina e Metronidazol. Submetido a abordagem cirúrgica com visualização a laparotomia de divertículo de Meckel. DISCUSSÃO: A intussuscepção intestinal é uma emergência abdominal comum em pacientes menores de 2 anos. Embora seja comum em lactentes deve-se levar em consideração esse diagnóstico em pacientes fora dessa faixa etária. A patogênese vai desde causas idiopáticas, infecções virais, bacteriana e causas subjacentes. O diagnóstico é realizado pelo ultrassom abdominal associado a história clínica de dor abdominal, cólica progressiva e vômito biliosos. Ao exame físico nota-se massa abdominal do lado direito do abdômen. Importante a diferenciação da intussuscepção de outras patologias associadas como alergia a proteína do leite de vaca. CONCLUSÃO: A história clínica associada a um exame de imagem possibilita o seu diagnóstico. Dessa forma o diagnóstico precoce evita desfecho desfavorável.