



Trabalhos Científicos

Título: Hérnia De Morgagni: Desafio Diagnóstico Em Pediatria

Autores: NATALIA SAORI NAKATA (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), LAÍS MARIA GASPAR COELHO (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), YASMIM MENDES SILVA (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), MARCELLA GONÇALVES FERREIRA (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), LUCIANA ANDREA DIGIERI CHICUTO (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), FERNANDO TAKEDA (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), ANA CLAUDIA SANTOS JUNQUEIRA FRANCO (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO)

Resumo: A hérnia de Morgagni é uma manifestação infrequente das hérnias congênitas do diafragma, representando menos de 5% das apresentações clínicas. Trata-se de uma herniação de conteúdo abdominal através da região anterior do diafragma - mais comumente a direita - em direção ao tórax. Relatamos o caso de um paciente com dois meses de vida internado para manejo de bronquiolite em seu quinto dia de sintoma. Antecedente de lábio leporino. Paciente evoluiu com melhora clínica, porém na radiografia de tórax apresentava elevação de cúpula diafragmática esquerda com imagem de difícil caracterização. Optado então por realização de tomografia que evidenciou interposição hepática na região anteroinferior do lado esquerdo do tórax, anteriormente ao diafragma e também dextrocardia. Na população pediátrica, a hérnia de Morgagni apresenta algumas peculiaridades. Associa-se a outras anomalias e possui alta incidência bilateral. Na grande maioria das vezes a sintomatologia é inespecífica podendo apresentar-se de forma assintomática ou, eventualmente, associada a infecções respiratórias de repetição. Geralmente a descoberta é acidental e acontece durante a realização de exames complementares de imagem. A hérnia de Morgagni é mais comum a direita. Quando ocorre do lado esquerdo, o órgão mais comumente herniado é o estômago. No nosso relato, o paciente apresentava defeito herniário à esquerda com herniação hepática, configurando raridade entre os casos já descritos na faixa etária pediátrica. Uma vez realizado o diagnóstico, é fundamental a investigação complementar de outras anomalias associadas. Seja a hérnia sintomática ou não, o acompanhamento conjunto com a equipe cirúrgica é sempre indispensável. Como os sintomas são inespecíficos e as descrições na literatura são escassas, o diagnóstico de Hérnia de Morgagni necessita de perspicácia diagnóstica e acontece tardiamente no manejo clínico da maioria dos casos, podendo predispor a complicações.