



Trabalhos Científicos

Título: Psoríase Pustulosa Generalizada Na Faixa Etária Pediátrica, Um Desafio Diagnóstico - Relato De Caso

Autores: MARCELA DE SÁ GOUVEIA (UFBA - HOSPITAL PROFESSOR EDGARD SANTOS), LORENA ALVES SANTOS (UFBA - HOSPITAL PROFESSOR EDGARD SANTOS), LOUISE ANDRADE GARBOGGINI (UFBA - HOSPITAL PROFESSOR EDGARD SANTOS), VANESSA CAMPOS DUARTE (UFBA - HOSPITAL PROFESSOR EDGARD SANTOS)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** Psoríase pustulosa generalizada (PPG) é a forma mais grave de psoríase. Doença inflamatória sistêmica crônica, caracterizada por eritema difuso e edema, com múltiplas pústulas estéreis. A PPG em muitos casos recai ao longo da vida e pode ser fatal. **RELATO DE CASO:** Masculino, 9 anos, cursando com lesões micropustulosas sob base eritematoedematosa, inicialmente em região axilar que se disseminaram para tronco, abdome, membros e face. Lesões coalescem formando lagos de pus, evoluem para crosta e cicatrizam, associadas a prurido e hiperalgesia. Afebril e sem sinais de toxemia. Histórico de lesões eritematosas recidivantes em axilas desde primeiro ano de vida, dermatite seborreica e alergia a proteína do leite de vaca. A possibilidade diagnóstica de farmacodermia foi afastada após ausência de melhora com a suspensão da Azitromicina e Aspirina em uso. Biópsia de pele confirmou PPG. Rastreo infeccioso negativo. Iniciado tratamento específico com Ciclosporina, resposta parcial, sendo introduzido Acitretina, evoluiu com remissão completa. **DISCUSSÃO:** A PPG na pediatria é uma forma de apresentação rara. Dados da literatura traz prevalência de 0,6% a 5% de todos os casos de psoríase em menores de dezesseis anos. De etiologia incerta, há evidências de que seja desencadeada por infecção ou uso de medicações, sendo a aspirina um dos fármacos mais relacionados, presente no caso descrito. Manifestações clínicas prévias ao quadro de PPG estão presentes, quadro clínico de psoríase invertida, vulgar e eritrodérmica. Na pediatria há maior dificuldade diagnóstica, uma vez que as lesões podem ser confundidas com apresentação cutânea de alergia alimentar. No caso, as manifestações cutâneas desde o primeiro ano de vida eram de psoríase invertida. A identificação precoce e tratamento específico reduzem quadros de maior gravidade, recorrência e mortalidade. **CONCLUSÃO:** Escassos são os registros na literatura da PPG na faixa etária pediátrica. A suspeição diagnóstica é de grande importância ao pediatra, favorecendo encaminhamento precoce para terapêutica adequada.