



Trabalhos Científicos

Título: Síndrome Oculoglandular De Parinaud: Um Relato De Caso

Autores: FLAVIA J. ALMEIDA (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), CAMILA FARIAS (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), PEDRO ZAMBUSI NAUFEL (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), PATRICIA TIEMI IKUHARA SANTOS (HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA), LARISSA CARVALHO CASER (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), VANESSA CRISTYNE SAUCEDO BATISTA (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), LAURA MARIA VISCARDI BRIGHENTI (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO), ISABELA MARAVALLE RAMOS (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO)

Resumo: INTRODUÇÃO: A SÍNDROME OCULOGLANDULAR DE PARINAUD (SOP) É UMA CONDIÇÃO CLÍNICA RARA CARACTERIZADA POR UMA SÍNDROME FEBRIL, ASSOCIADA A CONJUNTIVITE GRANULOMATOSA UNILATERAL E LINFADENOMEGALIA PRÉ-AURICULAR IPSILATERAL. ESTA INFECÇÃO PODE SER CAUSADA POR DIVERSOS AGENTES, PORÉM O MICROORGANISMO MAIS COMUM CAUSADOR DA SOP É O BACILO GRAM-NEGATIVO BARTONELLA HANSELAE (5,6,7), TAMBÉM CONHECIDO POR SER O AGENTE CAUSADOR DA DOENÇA DA ARRANHADURA DO GATO (1,10), PATOLOGIA BASTANTE FREQUENTE EM PAÍSES QUE POSSUEM HÁBITOS DE TER GATOS DE ESTIMAÇÕES EM SEUS DOMICÍLIOS, COMO É O CASO DO BRASIL. RELATO DE CASO: PACIENTE L.C.G., 10 ANOS, COMPARECEU EM NOSSO SERVIÇO COM QUEIXA DE APARECIMENTO DE UM 'CAROCINHO' EM PÁLPEBRA INFERIOR ESQUERDA HÁ 2 SEMANAS, INDOLOR E SEM SAÍDA DE SECREÇÃO. ALÉM DISSO, REFERIA NÓDULOS MÓVEIS EM REGIÃO CERVICAL E UMA TUMORAÇÃO PRÉ AURICULAR IPSILATERAL. EM ANAMNESE MAIS DIRIGIDA, REFERIA TER ADQUIRIDO UM GATO HÁ 2 MESES. SOLICITADA AVALIAÇÃO DA EQUIPE DA OFTALMOLOGIA, QUE SUGERIRAM O DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME OCULOGLANDULAR DE PARINAUD OPTADO ENTÃO, POR COLETA DE SOROLOGIA PARA BARTONELA, POSITIVA, E INTRODUZIDO EMPIRICAMENTE CLARITROMICINA. DISCUSSÃO : A SD OCULOGLANDULAR DE PARINAUD É UMA INFECÇÃO QUE PODE SER CAUSADA POR DIVERSOS AGENTES COMO CHLAMYDIA TRACCHOMATIS, SPOROTHRIX SCHENDCKII, MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, TREPONEMA PALLIDUM, FRANCISELLA TULARENSIS, SENDO O AGENTE MAIS COMUM A BARTONELLA HANSELAE. APESAR DE POUCO PREVALENTE, PRINCIPALMENTE EM PAÍSES DESENVOLVIDOS, ELA GANHA IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM LOCAIS ONDE EXISTEM GRANDES QUANTIDADES DE GATOS, SEU PRINCIPAL RESERVATÓRIO , COMO É O CASO DO BRASIL CONCLUSAO: APESAR DA SD OCULOGLANDULAR DE PARINAUD NÃO SER UMA AFECÇÃO MUITO PREVALENTE, SEUS SINAIS E SINTOMAS DEVEM SER BEM CONHECIDOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, VISTO QUE O DIAGNÓSTICO E TRATAMENTOS PRECOSES PODEM EVITAR SEQUELAS PERMANENTES.