



## Trabalhos Científicos

**Título:** Hemorragia Digestiva Alta Secundária A Hipertensão Portal Na Infância - Relato De Caso

**Autores:** LUIZA PANZERI FADIGA (HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI), LUISA DIAS E SILVA (HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI), MARCELLE BARÃO (HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI), ROBERTA FERREIRA BARROS DOS SANTOS (HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI), SUELLEN CUPERTINO XAVIER (HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI)

**Resumo:** Introdução: A hemorragia digestiva alta (HDA) é a principal complicação associada a trombose de veia porta (TVPo) e hipertensão porta (HP) em Pediatria. Este relato de caso tem por objetivos discutir, os fatores predisponentes para a formação de varizes de esôfago, suas manifestações clínicas e abordagem terapêutica mais utilizada pelos principais protocolos na pediatria. Descrição do caso: Paciente de 8 anos, sexo feminino, avaliada no Pronto Socorro por queixa de epigastralgia súbita seguida de hematêmese em grande quantidade. Antecedente de prematuridade, com 3 meses de internação neonatal. Ao exame físico inicial hipocorada, com esplenomegalia à palpação de abdome, porém sem sinais de choque. Após realização de exames complementares, confirmado diagnóstico de varizes de esôfago e provável hipertensão porta. Discussão: A obstrução extra-hepática da veia porta com hipertensão portal é uma das principais causas de hemorragia digestiva alta em crianças e adolescentes. Ela é secundária à transformação cavernomatosa de um trombo na veia porta sem doença hepática associada. É sabido que um dos fatores de risco para seu desenvolvimento é o cateterismo venoso umbilical (CVU) durante o período neonatal. Conclusão: Cabe nesses casos ressaltar a importância da investigação do passado médico da criança e instituir intervenções que previnam possíveis complicações.