



Trabalhos Científicos

Título: Fatores Gestacionais E Maternos De Crianças Que Passaram Por Aleitamento Materno Exclusivo

Autores: JOANA ROSA URBANO SOUSA COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)), CLARISSA GIOVANA LUNA DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)), JESSICA PAULA BENITEZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)), LUAN HENRIQUE MARCOLINO DIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)), HENRIQUE ANTONIO FONSECA DA MOTA NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)), MARILIA DENISE SARAIVA BARBOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB))

Resumo: **INTRODUÇÃO:** A amamentação é importante para melhorar a saúde e a sobrevivência infantil em todo o mundo. O lactente deve receber aleitamento materno exclusivo (AME) nos primeiros seis meses. **OBJETIVO:** O objetivo é analisar as características gestacionais e maternas das crianças que tiveram AME por 6 meses, acompanhadas num serviço de puericultura. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal e quantitativo. A amostra foi de 40 pacientes de até 1 ano atendidos no setor de puericultura de um hospital universitário e que tiveram AME por 6 meses. Os dados foram coletados por um período de 6 meses, através de questionário aplicado aos pais do lactente. Foram analisadas as variáveis: ocupação materna, quantidade de horas por dia que passa fora de casa, doenças na gestação, idade gestacional e complicações no nascimento. **RESULTADOS:** Observou-se que 62,5% das mães eram donas de casa, 25% tinham trabalho formal, 10% trabalho informal e 2,5% eram estudantes. 50% das mães relataram passar o dia todo em casa, 14% passavam até 6h fora de casa e 30% passavam de 6 a 12 horas. 65% tiveram alguma complicação na gestação e 37,5% tiveram alguma complicação no nascimento. Sobre a idade gestacional, 2,5% nasceram com até 28 semanas, 7,5% entre 29 e 33 semanas, 12,5% entre 34 e 36 semanas e 77,5% com >36 semanas de gestação. **CONCLUSÃO:** Portanto, observou-se que dentre os fatores maternos, a maior parte das mães são donas de casa e que passam a maior parte do dia em casa. A maioria teve alguma complicação na gestação. Também notou-se que a maior parte dos lactentes nasceram a termo. Através da observação dos fatores maternos e gestacionais pode-se criar intervenções direcionadas para melhorar os índices de AME, adequando-se às necessidades do lactente e possibilidades socioeconômicas dos genitores.