

Trabalhos Científicos

Título: Atresias Jejunoileais E Colônicas Concomitantes: Um Relato De Caso

Autores: AMANDA GOMES PINHEIRO (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - UNIPÊ), FERNANDO MACIEL DE CARVALHO (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - UNIPÊ), LARISSA MARIA MELO MOURA (UNIFACISA CENTRO UNIVERSITÁRIO), BRUNA FURTADO GAMBARRA (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - UNIPÊ), PAULO FRANCISCO LUCENA DE ARAÚJO ESPÍNOLA (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - UNIPÊ), JOSÉ LUCAS SARMENTO DE FIGUEIREDO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA), MARIANA CAMPOS DE ALMEIDA (UNIFACISA CENTRO UNIVERSITÁRIO), EDLA CAMILA ALVES CAMILO DANTAS (UNIFACISA CENTRO UNIVERSITÁRIO), ANA CAROLINE ALVES CAMILO DANTAS (UNIFACISA CENTRO UNIVERSITÁRIO), MELINA FIGUEIREDO MACHADO BRAZ (FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA)

Resumo: Introdução: A atresia intestinal consiste no bloqueio total ou na ausência de continuidade de algumas partes do intestino. Sendo a atresia jejunoileal presente a cada 1 em 5.000 - 14.000 nascidos vivos e a atresia colônica a cada 1 em 10.000 - 66.000 nascidos vivos. Descrição: E.V.S.S., sexo feminino, 6 dias, com vômitos biliosos desde o primeiro dia de vida, icterícia e ausência de eliminação de mecônio. Ao exame físico apresentava regular estado geral, ativa, corada, hidratada, acianótica, afebril, ictérica 2+/4+, eupneica, abdome plano, sem distensão, flácido, indolor, com ruídos hidroaéreos presentes e em uso de sonda orogástrica com resíduo bilioso. À radiografia abdominal foi visualizada distensão importante do jejuno proximal, sem gases no segmento distal. Foi indicada laparotomia exploradora que evidenciou múltiplas atresias intestinais, sendo realizadas ao todo 10 anastomoses no delgado e 3 anastomoses no cólon. Discussão: A atresia intestinal conforme a localização é classificada em: duodenal, jejunoileal e colônica. De acordo com a teoria mais aceita, o desenvolvimento da atresia jejunoileal é baseado em acidentes vasculares intrauterino. A mesma etiologia pode causar a atresia colônica, apesar desta representar apenas 2 a 15% dos casos. A presença de mais de uma atresia categoriza a patologia, segundo Louw, como tipo IV (múltiplas atresias). Sendo nesses casos necessária abordagem cirúrgica com ressecção da extremidade proximal dilatada, realização de anastomoses e frequentemente um estoma. Conclusão: O caso exposto apresenta quadro clínico e exame radiológico típicos da atresia jejunoileal. Contudo, o procedimento cirúrgico revelou também a presença de atresias colônicas, associação rara e pouco descrita na literatura. Nesse sentido, a clínica inespecífica e a grande extensão da patologia reafirmam a importância do diagnóstico e da abordagem cirúrgica precoce.