

## Trabalhos Científicos

**Título:** Perfil Dos Pacientes Com Criptorquidia De Um Ambulatório-Escola De Cirurgia Pediátrica De Uma Universidade Do Sul Do Brasil.

**Autores:** NATHALYA DE SOUZA SILVA (UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ), CAROLINA MARCHI GUERRA (UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ), SANDRA MARA WITKOWSKI (UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ), FABRICIO SBROGLIO LANDO (UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ), BRUNA THOMAS (UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ), GABRIELA FANTIN (UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ), CHRISTIAN PEREIRA GREGORY (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA), FERNANDA HELOISA CARDOSO VARGAS (UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ)

**Resumo:** Entre os lactentes do sexo masculino, a anomalia congênita urogenital mais comum é a criptorquidia. Trata-se de uma doença pediátrica que requer diagnóstico precoce e rápida intervenção cirúrgica. Avaliar as idades de encaminhamento, diagnóstico e avaliação pelo cirurgião pediátrico de pacientes com criptorquidia. Além de analisar a indicação cirúrgica para o tratamento. Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, analítico e transversal sobre a população pediátrica do sexo masculino que recebeu diagnóstico de criptorquidia após atendimento em um ambulatório-escola durante o período de fevereiro de 2017 até dezembro de 2022. Foram incluídos 93 prontuários que atendiam aos critérios estabelecidos. A mediana de idade de encaminhamento foi de aproximadamente 13 meses, enquanto as medianas das idades da primeira avaliação e do diagnóstico foram de aproximadamente 20 meses. Em relação a indicação cirúrgica, a maioria dos pacientes (84,9%) receberam indicação cirúrgica, esta ocorreu em 41,7% (n = 12) dos pacientes diagnosticados antes dos 6 meses de idade, 87% (n = 23) dos diagnosticados entre 6 e 12 meses e 93,1% (n = 58) dos diagnosticados após os 12 meses. Este estudo evidenciou que apesar da importância frente ao diagnóstico e tratamento precoce da criptorquidia, parte dos pacientes foram encaminhados para avaliação do cirurgião pediátrico após os 12 meses de idade e, conseqüentemente, tiveram indicação tardia do tratamento cirúrgico.